

Pré-test

1- Concernant les bêta-lactamases à spectre élargi (BLSE), quelles sont les propositions vraies ?

A- Elles représentent la quasi-totalité de la résistance aux C3G chez *E. coli* en France

B- L'incidence du portage communautaire se situe autour de 25 %

C- Le taux de portage digestif atteint 70 % chez les voyageurs au retour d'Asie

D- En cas de portage connu, un carbapénème doit être prescrit systématiquement à la phase initiale d'un sepsis

E- Le mode de dissémination de ce mécanisme de résistance justifie la mise en place de précautions complémentaires contact en établissement de soin

Bonnes réponses : A, C, E

2- En cas d'infection par un *E. coli* sécréteur de BLSE, quels sont les antibiotiques qui restent régulièrement actifs parmi les suivants ?

A- Temocilline

B- Aztreonam

C- Tobramycine

D- Cefoxitine

E- Amikacine

Bonnes réponses : A, D, E

3- Concernant *Enterobacter cloacae*, quelles sont les propositions vraies ?

A- Il s'agit d'une entérobactérie du groupe 3

B- Le mécanisme le plus fréquent de résistance aux céphalosporines est une BLSE

C- Le céfépime reste le plus souvent actif sur cette bactérie

D- Le ceftazidime est recommandé dans les infections liées à cette bactérie

E- Le mode de dissémination du principal mécanisme de résistance aux bêta-lactamines chez cette bactérie justifie la mise en place de précautions complémentaires contact en établissement de soin

Bonnes réponses : A, C

4- Concernant *Staphylococcus epidermidis*, quelles sont les propositions exactes ?

A- En cas d'infection ostéo-articulaire liée à cette bactérie, l'association fluoroquinolone – rifampicine constitue le traitement de référence

B- Cette bactérie est résistante aux pénicillines du groupe M dans plus de 2/3 des cas

C- Cette espèce est naturellement résistante à la fosfomycine

D- La téicoplanine constitue le plus souvent une alternative thérapeutique à la vancomycine

E- La rifampicine est le plus souvent inactive sur cette bactérie

Bonnes réponses : B

5- Parmi les antibiotiques suivants, lesquels disposent d'AMM en France ?

A- Dalbavancine

B- Témocilline

C- Ceftazidime-avibactam

D- Tédizolide

E- Telavancine

Bonnes réponses : A, B, C, D

6- Parmi les antibiotiques suivants, quels sont ceux qui subissent une interaction pharmacocinétique en cas d'association avec la rifampicine ?

A- Linézolide

B- Clindamycine

C- Vancomycine

D- Acide fusidique

E- Daptomycine

Bonnes réponses : A, B, D

7. Face à une infection de la peau et des tissus mous à *Staphylococcus aureus* résistant à la méticilline, sans signes de gravité, quel(s) antibiotique(s) peut (peuvent) être utilisé(s) en dehors de la vancomycine ?

A. cefotaxime

B. linézolide

C. clindamycine

D. cotrimoxazole

E. acide fucidique

Bonnes réponses : B,C,D,

8. Face à un cas de cystite à risque de complications chez une patiente de 76 ans ayant un antécédent d'infection urinaire à EBLSE il y a 4 mois quelle est votre attitude thérapeutique après réalisation d'un ECBU ?

A. Vous prescrivez de l'ertapénème

B. vous prescrivez du pivmecillinam

C. vous prescrivez de la témocilline

D. vous attendez l'antibiogramme

E. vous prescrivez de la cefixime

Bonne réponse : D

9. Parmi ces antibiotiques lesquels sont à rétrocession hospitalière ?

- A. Cefoxitine
- B. Imipénème cilastatine
- C. Vancomycine
- D. Amikacine
- E. Linezolide

Bonnes réponses : A, C, E

10. Parmi ces antibiotiques lesquels sont à prescription hospitalière ?

- A. Cefoxitine
- B. Imipénème cilastatine
- C. Vancomycine
- D. Amikacine
- E. Linezolide

Bonnes réponses : A,B,C,D,E