

Cas Clinique 2. « Contages »

Une femme de 30 ans, G1P0, enceinte à 13SA, vous contacte car elle a gardé sa nièce qui a développé le lendemain des lésions vésiculeuses évocatrices de varicelle.

1. Quels-sont les risques d'un contage varicelleux pendant la grossesse ?
2. Quelles sont les 3 principales questions à poser pour évaluer le risque de varicelle chez cette patiente et guider une éventuelle prise en charge ?
3. Il s'agit d'un contage étroit, datant de 48H, chez une femme non immune. Quel traitement prophylactique pouvez-vous proposer ?
 - A. Rien
 - B. Vaccination post exposition
 - C. Immunoglobulines polyvalentes
 - D. Immunoglobulines spécifiques
 - E. Valaciclovir
4. Le fils aîné de cette patiente, maintenant enceinte de 6 mois, a développé depuis une semaine une éruption fébrile de ce type. Quel est votre diagnostic pour l'enfant ? Proposez-vous un suivi spécifique pour la mère, et pourquoi ?



5. Une sérologie syphilis est pratiquée à 6 mois de grossesse : elle met en évidence un TPHA + 2400 U / un test Elisa Positif, et un VDRL + 120 U. Quel est votre diagnostic ? Quelles sont les conséquences possibles de cette infection pour la grossesse ? Quelle prise en charge recommandez-vous ?
6. La patiente projette un voyage à Cuba. Elle s'interroge sur le risque de ce voyage pour sa grossesse, notamment vis-à-vis du virus Zika ?