

QCM post tests

1. Quels antiparasitaires peuvent être administrés à la femme enceinte ?

- A. quinine
- B. méfloquine
- C. atovaquone proguanil
- D. artésunate
- E. ivermectine

2. Quels sont les conséquences d'une infection fœtale à Zika virus ?

- A. malformations oculaires
- B. malformations cérébrales
- C. microcéphalie
- D. hépatite aiguë
- E. pneumonie virale

3. Parmi la liste suivante, quelles molécules/médicaments peuvent être prescrites à une femme enceinte en prévision d'un voyage en zone tropicale ?

- A. vaccination anti amarile
- B. lopéramide
- C. aspirine
- D. azithromycine
- E. doxycycline

4. Concernant le contage varicelleux pendant la grossesse, quelles sont les propositions justes ?

- A. la varicelle est plus grave pendant la grossesse du fait du risque de pneumonie grave
- B. la varicelle est plus grave pendant la grossesse du fait du risque accru d'encéphalite virale
- C. le risque tératogène est estimé à environ 10% des infections au premier trimestre
- D. les immunoglobulines polyvalentes doivent être administrées en cas de contage avéré chez une femme non immune
- E. les immunoglobulines anti varicelleuses doivent être administrées en cas de contage avéré chez une femme non immune

5. Concernant la syphilis pendant la grossesse, quelles sont les propositions justes ?

- A. si la syphilis n'a pas été traitée pendant la grossesse, le nouveau-né doit bénéficier d'un traitement par pénicilline G
- B. la syphilis est associée à un risque accru de fausse couche et de prématurité
- C. plus de 50% des infections congénitales sont de diagnostic retardé, et peuvent comporter des lésions neurologiques, musculosquelettiques et cutanées
- D. la rhinorrhée est un bon signe de syphilis congénitale à la naissance
- E. en cas de diagnostic pendant la grossesse, un traitement antibiotique doit être idéalement administré à la mère avant 16 SA.

6. Une femme enceinte allergique grave aux bêtalactamines présente une fièvre à 38°, des brûlures mictionnelles et une bandelette urinaire positive.

Quel traitement pouvez-vous lui proposer ?

- A. amoxicilline IV
- B. aztréonam IV
- C. gentamicine IV
- D. nitrofurantoïne
- E. aucun avant documentation microbiologique

7. Parmi les propositions suivantes concernant l'endométrite du post-partum, lesquelles sont exactes ?

- A. l'accouchement par césarienne est un facteur de risque d'endométrite du post-partum
- B. le risque de développer une endométrite du post-partum est plus important en cas de vaginose bactérienne détectée au 1^{er} trimestre de grossesse
- C. une antibioprophylaxie systématique lors de l'accouchement par voie basse permet de prévenir l'endométrite du post-partum
- D. le streptocoque agalactiae est le principal pathogène incriminé dans l'endométrite du post-partum
- E. l'association amoxicilline - acide clavulanique est un schéma d'antibiothérapie recommandé dans le traitement curatif de l'endométrite du post-partum

8. Parmi la liste suivante, quelles situations contre-indiquent l'allaitement ?

- A. infection VIH
- B. infection HTLV
- C. vaccination anti amarile de la mère au premier mois du post partum
- D. vaccination anti rougeoleuse de la mère au premier mois du post partum
- E. vaccination maternelle anti-coqueluche au premier mois du post partum

9. Concernant les modifications pharmacologiques survenant pendant la grossesse, quelles sont les propositions justes ?

- A. augmentation précoce du volume plasmatique
- B. augmentation de la fraction libre des antibiotiques
- C. augmentation de l'absorption intestinale
- D. augmentation de la filtration rénale
- E. freination de tous les cytochromes hépatiques

10. Concernant la listériose chez la femme enceinte, quelles sont les propositions justes ?

- A. On recense entre 30 et 50 cas par an
- B. On recense entre 3000 et 5000 cas par an
- C. Elle peut se compliquer de perte fœtale
- D. Elle peut se compliquer de prématurité
- E. Elle peut se compliquer d'infections cérébrales fœtales tératogènes