



Les mutilations sexuelles féminines: prévenir, dépister et prendre en charge

Claire Tantet

Service de Maladies Infectieuses

Hôpital Avicenne (Bobigny)

Hôpital Bichat (Paris)

27 Mars 2019




Figure 1: Anatomie vulvaire






Figure 2: Anatomie de l'organe clitoridien

TYPE I




TYPE II




Toute intervention incluant l'ablation totale ou partielle des organes génitaux externes de la femme ou autre lésion des organes génitaux externes pratiquée pour des raisons non médicales

TYPE I



TYPE I







Fig. 3: Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans ayant subi une MSF

UNICEF, *Female Genital Mutilation/ Cutting: a global concern*, 2016

Appartenance ethnique



Pourcentage de femmes excisées de 15 à 49 ans selon les ethnies sénégalaises, données UNICEF 2013

Pourquoi?

- Assurance de faire un bon mariage
- Préservation de la virginité jusqu'au mariage
- Purifier, « être salindé », apte à la prière
- Evènement social, norme sociale, identité culturelle

La loi dans le monde


- **En Afrique:** 36 pays d'Afrique ont banni l'excision par un décret national ou une loi
- Au niveau international: violences faites aux femmes, violations des droits de l'homme et de l'enfant
- En France: c'est un crime
Obligation de signalement par les médecins [Art. 223-6](#)

Les complications

Urinaires

Cicatricielles

Obstétricales/
Pédiatriques



Infectieuses

Psychologiques

Douleur

Sexuelles

Ou aucune complication...

Chaque vécu est différent

Chaque sexualité aussi

Toujours revenir à l'histoire de la patiente et à son vécu

Comment dépister?

Diagnostic d'interrogatoire d'un problème médical

- Le plus simplement possible
- Fait partie de l'histoire des femmes
- L'intégrer à l'interrogatoire
- Dépistage médical
- Pourquoi est-ce difficile pour les soignant.e.s?

Comment dépister?

- Avez-vous subi une excision?
- Pensez-vous être gênée par votre excision dans votre vie quotidienne?
- Savez-vous qu'il existe des centres de prise en charge en France ?
- Avez-vous des filles?
- Interprètes parfois nécessaire (ISM)

Prise en charge multidisciplinaire

Médicale: gynécologique, médecin de la douleur

Chirurgicale

Sexologique

Psychologique

Médecines alternatives

Chirurgie clitoridienne



1. MSF de type II avant l'intervention



2. J7 après transposition du clitoris



3. 3 mois après l'intervention



4. 1 an après l'intervention




Figure 5: Reconstruction clitoridienne

www.thelancet.com Vol 380 July 14, 2012

Remerciements au Dr Stéphane Bounan

A

B

Désinfibulation




Figure 3. Types of female genital mutilation (FGM) III. **A**, FGM type IIIa: apposition of labia minora. **B**, FGM type IIIb: apposition of labia majora. **C** and **D**, The clitoris was found intact under the scar after defibulation. The clitoris or clitoral stump may be more or less visible and palpable. © 2018 Jasmine Abdulcadir.

Former au dépistage systématique

- Par les médecins
- Par les paramédicaux
- Outils de consultation:

Association Combattre l'excision:

<http://www.combattrelexcision.org>



SUSTAINABLE DEVELOPMENT G

5 GENDER EQUALITY



5.3

Eliminate all harmful practices, such as child, early and forced marriage and female genital mutilation



Objectif 2016 des Nations-Unies: disparition des MSF en 2030

Contacts

Equipe Bichat:

Envoyer un mail à combattre.excision@aphp.fr

Equipe Avicenne:

Envoyer un mail à santesexuelle@aphp.fr

Me mettre en copie:

claire.tantet@aphp.fr

+33 6 62 88 10 95

Avec les coordonnées de la patiente (nom, prénom, DDN, téléphone)
et elle sera rappelée

Contacts

Association Combattre l'excision:

Développement d'outils pédagogiques autour des mutilations sexuelles féminines pour les professionnel(le)s de santé

M'envoyer un mail pour commander les documents

Liens pour faire un don:

<https://www.helloasso.com/associations/combattre-l-excision>