Influence d'une antibiothérapie préalable à l'hospitalisation chez les sujets âgés présentant une pneumonie aigüe communautaire sévère.

*Aillet C, Demonchy E, Courjon J, Caisso C, Garzaro M, Roger PM
Infectiologie, Centre Hospitalier Universitaire de Nice, Université de Nice Sophia-Antipolis, France*

INTRODUCTION

-Le mauvais pronostic des PAC chez les patients âgés implique une antibiothérapie précoce. De fait, les patients peuvent être traités antérieurement à leur hospitalisation.

-Notre objectif était de quantifier les patients hospitalisés pour PAC sévères ayant bénéficié d'une antibiothérapie avant hospitalisation et d'en chercher les conséquences sur le diagnostic microbiologique et sur l'évolution.

METHODE

- étude monocentrique de cohorte de patients admis en infectiologie de juin 2005 à février 2016.
- patients d'âge ≥ 65 ans, seuls les score 4 et 5 de Fine étant inclus
- antibiothérapies (nature, nombre et durée) avant hospitalisation extraites des dossiers médicaux
- antibiothérapies avant hospitalisation classées en adéquates ou non selon la conférence de consensus française de 2010
- évolution défavorable : besoin de recours aux soins intensifs et/ou à la survenue du décès

RESULTATS

- 509 patients présentant une PAC sévère hospitalisés, dont 79 (15,5%) bénéficiant d'une antibiothérapie avant hospitalisation.
- 41/79 (52%) antibiothérapies adéquates
- durée d'antibiothérapie connue dans 68 cas (86%): médiane de 4 jours [1 - 14]
- 37/68 antibiothérapies (54%) prolongées au-delà de 3 jours (pas de réévaluation) dont 27 (40%) 5 jour et plus.
- 23 patients (29%) avaient reçu une antibiothérapie inadéquate pendant plus de 3 jours, et 14 patients pendant plus de 5 jours

Antibiothérapie pré-hospitalière

Caractéristiques des patients bénéficiant d'une antibiothérapie avant hospitalisation

	ATB Pré-hospitalière n = 79 (15.52)	Sans ATB pré- hospitalière n = 430 (84.47)	p
Age	81±8.0	82±8	0.251
Sex-ratio (M/F)	1.40	1.70	0.418
Comorbidités			
- cardiovasculaire	45 (56.9)	254(59.1)	0.726
- diabète	17 (21.5)	78 (18.1)	0.478
-neurologique/ psychiatrique	28 (35.4)	124 (28.9)	0.238
- pulmonaire	18 (22.8)	113 (26.3)	0.513
- cancers/ immunodépression	10 (12.6)	60 (13.9)	0.758
- HIV	2(2.53)	5 (1.16)	0.663
- Alcoolisme chronique	0 (0)	19 (4.4)	0.337
Fine 4	63 (79.7)	334 (77.7)	0.682
Fine 5	16 (20.2)	96 (22.3)	0.682
Données microbiologiques			
- Infection documentée	29 (36.7)	175(40.7)	0.506
- bactériémie	3 (3.8)	31 (7.2.)	0.619
- Prélèvements respiratoires	17 (21)	76 (18)	0.416
Agents pathogènes			
- Streptococcus pneumoniae	8 (10.1)	78 (18.1)	0.080
- Legionella pneumophila*	4 (5.1)	21 (4.9)	0.999
- Enterobacteriaceae	29 (6.7)	6 (7.6)	0.783
- Klebsiella pneumoniae	3 (4.1)	4 (0.1)	0.118
- Haemophilus influenzae	2 (2.5)	6 (1.4)	0.455
- Staphylococcus aureus	4 (5.1)	10 (2.3)	0.320
- Pseudomonas aeruginosa	4 (5.1)	16 (3.7)	0.572
- Atypical pathogens	6 (7.6)	23 (5.3)	0.428
- Influenza virus	1 (1.3)	10 (2.3)	0.860
Evolution défavorable	9 (11.4)	63 (14)	0.444

RESULTATS

Facteurs de risque associés à une évolution défavorable. Analyse univariée.

	Evolution favorable n = 437 (85.85)	Evolution défavorable n = 72 (14.14)	p
Age (years)	82±8	83±7	0.207
Sex-ratio (H/F)	1.63	1.76	0.761
ATB avant	70 (16)	9 (12.5)	0.444
ATB avant non adéquate	35 (50)	3 (3.33)	0.553
Durée	4.4 ± 2.9	6.4 +/- 3.3	0.095
Durée < 3 jours	29 (48)	2 (25)	0.386
Durée > 3 jours	31 (51.66)	6 (75)	0.213
Durée> 5 jours	38 (63.33)	3 (37.5)	0.160
Comorbidités			
- cardio-vasculaire	252 (59.95)	37 (51.38)	0.171
- Insuffisance cardiaque	44 (10.06)	8 (11.11)	0.786
- diabète	73 (17.6)	13 (20.3)	0.610
- Neurologique et/ou psychiatrique	127 (30.6)	16 (25)	0.330
- pulmonaire	104 (25.1)	17 (26.6)	0.891
- BPCO	61 (15.1)	12 (18.7)	0.422
- cancers / immunodépression	49 (11.8)	9 (14.1)	0.438
- HIV	6 (1.4)	0 (0)	0.279
- Alcoolisme chronique	13 (3.5)	5 (7.9)	0.120
- Hépatopathie	17 (4.1)	7 (11)	0.090
- Insuffisance rénale	58 (14)	9 (14.1)	0.827
Fine 4	336 (81)	36 (56.3)	< 0.0001
Fine 5	78 (18.8)	28 (43.7)	< 0.0001
Données microbiologiques			
-Bactériémie	24 (6.3)	5 (7.9)	0.536
-Prélèvements respiratoires	69(89.6)	20 (95.0)	0.024
Agents pathogènes			
- Streptococcus pneumoniae	236 (18.5)	16 (16.3)	0.462
- Legionella pneumophila	19 (5.0)	3 (4.8)	0.752
- Enterobactérie	23 (5.6)	5 (7.8)	0.981
- Klebsiella p	6 (1.5)	1 (1.6)	0.977
- Haemophilus influenzae	6 (1.5)	0	0.892
- Staphylococcus aureus	21 (1.6)	5 (5.1)	0.427
- Pseudomonas aeruginosa	13 (1.0)	6 (6.1)	0.026
- Atypiques	12 (3.0)	1 (1.6)	0.379
- Influenza virus	10 (2.5)	1 (1.6)	0.960

- Une évolution défavorable était observée 72 fois (14%), dont 9/69 fois chez les patients préalablement traités (12.5%) et chez 6/26 patients ayant reçu plus de 3 jours d'antibiothérapie.

Analyse multivariée

Les facteurs de risque associés à une évolution défavorable étaient le score de Fine 5: OR [95%CI] 10.1 [1.58 – 65.2] p = 0.014 et une tendance avec le fait d'avoir reçu une antibiothérapie pré-hospitalière durant plus de 5 jours : OR 5.58 [0.88 – 35.71].

Conclusion

-L'antibiothérapie avant hospitalisation des patients âgés présentant une PAC sévère était fréquemment inadéquate, de manière prolongée dans près de la moitié des cas.

-Sans impact sur le taux de documentation microbiologique.

- La durée d'antibiothérapie avant hospitalisation était associée à une évolution défavorable.