



Caractéristiques socio-démographiques et risques périnataux des femmes enceintes migrantes primo-arrivantes : étude de 212 femmes suivies au réseau Louis Guilloux (CMLG) à Rennes

L Dessaint, D Michel, J Chaplain, P Jarno, H Leroy

Introduction, matériel et méthode

- ❖ **Précarité** de la santé sexuelle & reproductive des populations migrantes



- ❖ Population immigrée en France : **jeune, se féminisant**



- ❖ Constat de **mauvaises issues de grossesses** chez les migrantes primo-arrivantes
CMLG



- ❖ **Etude descriptive**

- ❖ **Population** : toutes les femmes enceintes suivies au CMLG / DDG entre juillet 2008 et décembre 2015

- ❖ **Données** : recueil rétrospectif (CHU Rennes et CMLG)

- ❖ **Objectifs** :

- (1) **Description des grossesses, comparaison avec la population de l'Enquête Nationale Périnatale (2010)**
- (2) **Impact de certaines variables médico-sociales sur issues et complications de la grossesse**

Description de la population et des grossesses

212 femmes

Age médian / Mineures	(% de la cohorte)	28 ans / 7%
Origine géographique		Afrique (42%) / Asie (33%) / Europe (23%)
Statut administratif		Demande d'asile (60%) / Situation irrégulière (15%)
Situation maritale		Couple (55%) / Seule (21%) / Famille - enfants (17%)
Logement		SDF (54%) / Logement précaire (32%) / Logement fixe (14%)
Droits de santé non ouverts		43 %
Violences subies / ATCD viol	(% de la cohorte)	45% / 10%
Infections chroniques	VHB	7 % (20% d'hépatites B guéries)
	VHC	3 %
	VIH	3 %

299 grossesses


Grossesse non désirée : 1 femme sur 3

Issue : **Terme (70%) / IVG (16%) / FCS (10%) / autres : MFIU, ITG, GEU (4%)**

Grossesses menées à terme

- Début de grossesse avant l'arrivée : **40%**
- Un suivi prénatal sous-optimal : 3 échographies recommandées (**40%**)
- Incidence des complications gravidiques, versus ENP
- Plus de malformations congénitales (NN vivants) : **5%** (2,5%, InVS)
- Décès : **1** femme, **2** décès post-nataux

50 %



	Femmes migrantes à Rennes	ENP (2010)	p
Hospitalisation	25 %	19 %	> 0,05
Prématurité	8 %	5,5 %	> 0,05
Poids de naissance < 2,5 kg	8 %	6,4 %	> 0,05
Déchirures périnéales	55 %	43 %	> 0,05
Hémorragie de la délivrance	10 %	4 %	> 0,05

❖ Plus de **césariennes** chez les femmes originaires d'Afrique sub-saharienne

Origine géographique	Asie	Europe	Afrique (ASS)	p
Taux de césarienne	18 %	9 %	27% (27,5%)	0,03

❖ **IVG** : Plus d'antécédents de violences subies chez les femmes ayant réalisé une IVG

Issues de grossesse	IVG	FCS	Menée à terme	p
ATCD violences subies	78 %	50 %	42 %	0,007
ATCD viol	26 %	7 %	9,5 %	0,01

Conclusion