Antibiothérapie parentérale à l'hôpital et au domicile

Pascale Longuet
Argenteuil

Déclaration de liens d'intérêt avec les industries de santé en rapport avec le thème de la présentation (loi du 04/03/2002) :

Intervenant : LONGUET pascale

Titre : Antibiothérapie parentérale à l'hôpital et au domicile

L'orateur ne souhaite pas répondre

Consultant ou membre d'un conseil scientifique
MSD, Astellas

OUI NON

Conférencier ou auteur/rédacteur rémunéré d'articles ou documents

OUI NON

Prise en charge de frais de voyage, d'hébergement ou d'inscription à des congrès ou autres manifestations
Eumédica

OUI NON

Investigateur principal d'une recherche ou d'une étude clinique

OUI NON

Résistance aux antibiotiques

Pénurie de nouveaux antibiotiques

- ❖ **PRESERVER L'EFFICACITE** des antibiotiques existants
- ❖ **PREVENIR** l'émergence de la **RESISTANCE**

- Comment ?

- Modalités de préparation
- Modalités d'administration

- Intérêt

- Pas d'inactivation avant ou pendant administration
- Optimisation de l'efficacité
- Limitation incidents de perf

1- les ingrédients: Antibiotiques injectables

- Solutions prêtes à l'emploi
- Poudre à reconstituer et à diluer

Maîtrise et contrôle des paramètres physico-chimiques

Paramètres physico-chimiques: INCOMPATIBILITÉ

- changement d'un état physique par un phénomène physico-chimique lors de l'administration concomitante de différents produits incompatibles sur la même voie veineuse

Médic + solvant: Attention au pH!

Cristaux de furosémide dans G5%

Tiré de: Programme KIK 2.1, BBraun, 2002

Précipitation de midazolam dans rampe

Tiré de: Programme KIK 2.1, BBraun, 2002

Précipitation de vancomycine dans tubulure

Tiré de: Programme KIK 2.1, BBraun, 2002

- Obstruction des cathéters
- Perte d'efficacité
- Formation de dérivés toxiques
- Risque d'embolie

Incompatibilités ça veut dire

- **Pas de mélange** dans même conditionnement
- **Rincer** après chaque administration
- Privilégier **voies d'administration différentes** lors d'administrations prolongées ou continues

Paramètres physico-chimiques

STABILITE

- **Capacité d'une solution à conserver**
- **Ses propriétés chimiques**
 - au moins **90% de la concentration initiale en principe actif**
 - Avec des produits de dégradation non toxiques
- **Ses propriétés physiques**
 - Pas de signe organoleptique de dégradation (couleur, odeur, goût, ...)
 - Maintien des propriétés mécaniques (viscosité, précipitation)
- **Ses propriétés microbiologiques**

Facteurs influençant la stabilité

- **Concentration finale** solution après dilution
- **Solvant** utilisé

A température ambiante

Méropénème

Materiel	Solvant	Concentration perfusion	Temps de stabilité
PVC	NaCl 0.9%	1 g/L	24h
PVC	NaCl 0.9%	20 g/L	10h
PP	NaCl 0.9%	5 g/L	6h
PVC	Glucose	1 g/L	4h
PVC	Glucose	20 g/L	3h

Amoxicilline

Solvant	Concentration de perfusion	Temps de stabilité
NaCl 0.9%	10-20 g/L	8h
NaCl 0.9%	50 g/L	3h
Glucose	10 g/L	2h
Glucose	50 g/L	1h

PVC: Polyvinyl chlorure; PP: Polypropylène

Facteurs influençant la stabilité

• Température

Tableau 6 Stabilité de différentes bêta-lactamines en fonction de la température.

Durée de stabilité (heures) : dégradation < 10 %

	37 °C	25 °C
Aztréonam	> 24	—
Pipéracilline	21	30
PIP + tazobactam	> 24	72
Ceftazidime	8	24
Céfépime	13	20
Cefpirome	7	23
Imipénème	3	3,5
Méropénème	1,5	5

Stability of benzylpenicillin during continuous home intravenous therapy

Jane W. A. Vella-Brincat^{1*},

Journal of Antimicrobial Chemotherapy (2004) **53**, 675–677

Figure 1. Percentages of the initial concentrations of benzylpenicillin stored at 36°C, 26°C and room temperature (21–22°C) for 24 h (means $\pm$ S.E.M.).

Paramètres physico-chimiques: STABILITE

La **stabilité** d'une préparation est **spécifique**

- d'un médicament donné
- dans un solvant donné
- à une concentration donnée
- dans un contenant donné
- à une température donnée
- dans des conditions de conservation données

2- Optimisation de l'efficacité des antibiotiques

Prise en compte de leur relations PK/PD

Pharmacocinétique / Pharmacodynamie des AB

PK/PD

- **Pharmacocinétique**

Ce que l'hôte fait avec le médicament....

- Absorption
 - Métabolisme
 - Élimination
-
- C_{max}
ASCourbe
demi-vie

- **Pharmacodynamie**

Ce que le médicament fait au micro-organisme....

- Effets directs
 - Effets post-exposition
 - Sélection / induction
-
- E_{max}, vitesse de bactéricidie
PAE...
résistance

Adapté de H. Derendorf (2d ISAP Educational Workshop, 2000)

2 grandes familles d'antibiotiques

Temps-dépendant

Vitesse de bactéricidie
du latamoxef sur E. coli

Concentration-dépendante

Vitesse de bactéricidie
de la tobramycine sur E. coli

Antibiotiques concentration-dépendants

Pic élevé >>> CMI

Que signifie un rapport "PIC / CMI" ... ?

Dose unique journalière

Antibiotiques temps-dépendant

- Concentration **le plus longtemps possible > à CMI**

Relationship between β -lactam T>MIC and eradication in AOM and sinusitis

W Craig, D Andes: CMI 2005 (11) s6: 10

Relationship between cephalosporin percentage T>MIC and efficacy against Enterobacteriaceae

Combien de temps faut-il rester au-dessus de la CMI ?

Plusieurs injections intermittentes ou perfusion prolongée ou continue

Antibiotiques temps-dépendants

Que signifie un " temps > CMI " ... ?

T > CMI → dépend de la dose et de la fréquence d'administration

Antibiotiques temps-dépendants

Temps > CMI: faut-il augmenter la dose ou la fréquence d'administration ?

3 - La marmite : Les dispositifs de perfusion

Dispositif	Avantages	Inconvénients	Marges d'erreur
Perfuseur par gravité	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Simple d'emploi ☒ Bon marché 	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Pas de réglage précis ☒ Instabilité du débit ++ 	20 à 40%
Pousse seringue	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Précision importante du débit ☒ Intérêt pour dosages de précision, débits faibles, molécules nécessitant un débit très précis ☒ Alarmes de pression 	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Volume de dilution limité à 50 ml 	3%
Pompe volumétrique	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Alarmes ☒ Maintien de la veine ouverte ☒ Mode séquentiel avec bolus possible ☒ Perfusion de grands volumes possible 	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Attention à la stabilité du produit lorsque le produit n'est préparé qu'une fois/24h en cas d'utilisation du mode séquentiel 	5%
Diffuseur portable	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Pression positive en fin de perfusion ☒ Grands volumes possibles ☒ Permet des perfusions courtes (30 à 60 mn) ET des perfusions prolongées/continues 	<ul style="list-style-type: none"> ☒ La précision du débit dépend de la viscosité de la solution et de la température 	15%

4 - les questions à se poser

Produit suffisamment stable pour envisager ?	ATTENTION A
Une préparation à l'avance Une perfusion prolongée ou continue	Durée de stabilité du produit reconstitué
Une perfusion en diffuseur	Stabilité à Température > 25°C
Une perfusion à la seringue électrique	Problème de volume de dilution finale

Pourquoi ?

Stabilité	Pourquoi ?	Que faire ?
Amoxicilline IVSE continu 8 à 12 g/j en 1 ou 2 fois : concentration finale 80 à 240 mg/ml	Stabilité NaCl 0,9% 25°C 20 mg/ml = 8h	Pompe volumétrique ou seringues électriques plus fréquentes
Amox-acide clav 1g IVL x 3/j	La perfusion doit être terminée au max 60mn après la dilution	Préparation Immédiate Surveillance perfusion par gravité
Cefotaxime IVSE continu 8 à 12 g/j en une ou 2 fois : concentration finale 80 à 240 mg/ml	Concentration max de solubilité : 20 mg/ml	Pompes volumétriques

Pourquoi ?

Toxicité	Pourquoi ?	Que faire ?																															
<p>Vancomycine Dose totale/24h en continu seringue électrique soit 3000mg dans 50 ml = 60 mg/ml</p>	<p>Veine périphérique : concentration maximale tolérée = 5 mg/ml</p>	<p>Utilisation pompe volumétrique ou seringues électriques plus fréquentes</p>																															
<p>Ceftazidime en perfusion continue sur 24h préparation 1 ou 2 fois/</p>	<p>Hydrolyse spontanée, responsable production pyridine, dérivé toxique dont la concentration doit rester < 1,1 mg/ml. Production temps, concentration et température dépendante</p> <table border="1"> <caption>Pyridine production (mg/ml) vs. Time (hours) and Temperature</caption> <thead> <tr> <th>Concentration (w/v)</th> <th>Temperature (°C)</th> <th>8h</th> <th>16h</th> <th>24h</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">8.3%</td> <td>37°C</td> <td>~0.4</td> <td>~0.8</td> <td>~1.0</td> </tr> <tr> <td>25°C</td> <td>~0.3</td> <td>~0.6</td> <td>~0.8</td> </tr> <tr> <td>4°C</td> <td>~0.2</td> <td>~0.4</td> <td>~0.6</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">12%</td> <td>37°C</td> <td>~0.5</td> <td>~1.8</td> <td>~4.2</td> </tr> <tr> <td>25°C</td> <td>~0.4</td> <td>~1.2</td> <td>~1.5</td> </tr> <tr> <td>4°C</td> <td>~0.3</td> <td>~0.8</td> <td>~1.0</td> </tr> </tbody> </table>	Concentration (w/v)	Temperature (°C)	8h	16h	24h	8.3%	37°C	~0.4	~0.8	~1.0	25°C	~0.3	~0.6	~0.8	4°C	~0.2	~0.4	~0.6	12%	37°C	~0.5	~1.8	~4.2	25°C	~0.4	~1.2	~1.5	4°C	~0.3	~0.8	~1.0	<p>Perfusion continue sur 8h avec concentration finale <80 mg/ml</p>
Concentration (w/v)	Temperature (°C)	8h	16h	24h																													
8.3%	37°C	~0.4	~0.8	~1.0																													
	25°C	~0.3	~0.6	~0.8																													
	4°C	~0.2	~0.4	~0.6																													
12%	37°C	~0.5	~1.8	~4.2																													
	25°C	~0.4	~1.2	~1.5																													
	4°C	~0.3	~0.8	~1.0																													

5 – A l'aide

Guide de préparation

ELSEVIER

CrossMark

Disponible en ligne sur

ScienceDirect

www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France

EM|consulte

www.em-consulte.com

Médecine et
maladies infectieuses

Médecine et maladies infectieuses 46 (2016) 242–268

Recommandation/Recommandations

Preparing and administering injectable antibiotics: How to avoid playing God[◇]

Préparation et administration des antibiotiques par voie injectable : comment éviter de jouer à l'apprenti sorcier

P. Longuet^a, A.L. Lecapitaine^b, B. Cassard^c, R. Batista^d, R. Gauzit^{e,*}, P. Lesprit^f, R. Haddad^g,
D. Vanjak^h, S. Diamantisⁱ, Groupe des référents en infectiologie d'Île-de-France (GRIF)

Guide de préparation

Antibiotique	Reconstitution	PERFUSIONS INTERMITTENTES			AUTRES MODES D'ADMINISTRATION (voir protocoles joints)		Remarques	Ville Oui/non	Référence
		Solvant	Stabilité *	Administration	Continu IVSE ou Pompe ou Perfusion prolongée	Diffuseur			
DCI Spécialité Présentation	Solvant, volume	Solvant Concentration finale souhaitée pour perfusion IV (Volume de dilution)							
amikacine Amiklin® 50/250/500/1000 mg	EPTI 1ml/50mg 2ml/250mg 4ml/500mg 5ml/1000mg	NaCl 0,9%, G5% 20 mg/ml max (500mg dans 25 ml)	24h à 25°C Administration immédiate	Perfusion de 30mn Pas d'IVD ni de SC IM possibles, à éviter	pas d'intérêt	OUI Si perfusion de 30 min	Pic 30mn après fin perfusion Résiduelle si durée > 5j ou insuffisance rénale Néphrotoxicité, ototoxicité	OUI	8,9
amoxicilline Clamoxyl® 500mg/1/2g	EPTI 20ml/1g si IV 5ml/1gr si IM	NaCl 0,9% Max 20 mg/ml (1g dans 50 ml)	NaCl 0,9% à 25°C 20mg/ml : 8 h	IVD (3-4mn) : max 1g IVL (30-60mn) : max 2 g chez adulte 50mg/kg chez enfant IM possible	IV continu à la pompe sur 8h x3/j	NON Non rétrocédable	Hyperhydratation si > 2g/perf (cristallurie) Stabilité altérée par le G5%	NON	12, 13, 18
amoxicilline + acide clavulanique Augmentin® 500mg-50mg 1g/100mg 1g/200mg 2g/200mg	EPTI NaCl 0,9% 20ml/g	NaCl 0,9% uniquement Max 20mg/ml (1g/200mg dans 50ml)	Administration immédiate	IVD (3-4mn) : max 1g/injection adulte 25mg/kg/injection enfant IVL (30-60mn) : max 2g/injection adulte 50mg/kg/injection chez enfant Terminer la perfusion au max 60mn après la dilution	Non pour problème de stabilité	OUI Si perfusion de 30 min	Dose max acide clavulanique chez adulte 200mg/injection soit 1200mg/j Si perfusion de solution glucosée, clamber la perfusion avant injection de l'antibiotique	OUI	8,12,13

Guide de préparation

Tableau 4 : Administration prolongée des antibiotiques en ambulatoire, dans des diffuseurs ou par pompe

- 1) Les diffuseurs et pompes portables sont portés par les patients près du corps, ce qui soumet le contenant à des températures élevées (32-33°)
 - Pour quelques antibiotiques, il existe des données de stabilité à des températures au-delà de 25°: pipéracilline + tazobactam, ceftazidime, cefepime, aztreonam
 - Pour les autres antibiotiques, il n'existe pas de données au-delà de 25°. Il est donc souhaitable que les diffuseurs/pompes soient placés dans des sacs isothermes : pénicilline G, amoxicilline, oxacilline, ticarcilline, ticarcilline + acide clavulanique, ceftazoline, ceftoxitine, cefotaxime
 - En cas de dilution dans du G5, le débit théorique peut varier de 10% environ avec les diffuseurs. La dilution dans du NaCl est donc à privilégier, sauf en cas de meilleure stabilité dans du G5.
- 2) Disponibilité : O (en officine) ou R (Rétrocédable) / H : HAD

MOLECULE	CONCENTRATION MAXIMALE SOUHAITEE	SOLUTE DE DILUTION	STABILITE	NOMBRES DE PASSAGES PAR JOUR NECESSAIRES SELON POSOLOGIE JOURNALIERE	DISPONIBILITE DE L'ANTIBIOTIQUE
PENICILLINE G	200 000 U/ml	NaCl	12h à 25°	2 passages/jour	H
AMOXICILLINE*	20 mg/ml	NaCl	8h à 25°	2 à 3 passages/jour	H
CLOXACILLINE	50 mg/ml	G5	24h à 23°	2 passages/jour en l'absence de données au-delà de 23° en HAD	H
TICARCILLINE	100 mg/ml	NaCl	24h à 24°	Possibilité un seul passage par jour	O
TEMOCILLINE	80 mg/ml	Eau PPI**	24h à 25° 24 h à 37°	Possibilité un seul passage par jour, en HAD	H
PIPERACILLINE	80 mg/ml	NaCl ou G5	24h à 24° 21h à 37°	Possibilité un seul passage par jour, en HAD	H
PIPERACILLINE + TAZOBACTAM	80 mg/ml + 10 mg/ml	NaCl ou G5	24h à 25° 24 h à 37°	Possibilité un seul passage par jour	O
CEFAZOLINE	100 mg/ml	NaCl ou G5	24h à 4°	Possibilité un seul passage par jour, en HAD	H
CEFOXITINE	40 mg/ml	NaCl	24 h à 37°	1 à 2 passages/jour, en HAD	R
CEFOTAXIME*	20 mg/ml	NaCl ou G5	24h à 24° Limites de stabilité	Privilégier 2 passages/jour En HAD	H
CEFTAZIDIME	80 mg/ml	NaCl ou G5	8h à 21° 8h à 37°	3 passages/jour	O
CEFEPIME*	50 mg/ml	NaCl ou G5	Stable 8h à 25°	Par perfusions intermittentes sur 30 min' uniquement*** 3 passages/jour	O
AZTREONAM	100 mg/ml	NaCl	24h à 25° 24h à 37°	Possibilité un seul passage par jour	O
VANCOMYCINE	5 mg/ml**** sur VVP 80 mg/ml sur VVC	NaCl	24h à 25°	Possibilité un seul passage par jour	R
CLINDAMYCINE	60 mg/ml	NaCl	24 h à 25°	Possibilité un seul passage par jour, En HAD	H

Guide de préparation

Tableau 3 : Administration des antibiotiques en perfusion prolongée / continue à l'hôpital

- Chaque médicament doit être administré sur une voie veineuse dédiée. Dans le cas contraire, le prescripteur doit vérifier que la co-administration est possible. L'administration en continu peut être remplacée par la perfusion prolongée (sur 3-4h) pour permettre d'utiliser la voie veineuse pour d'autres administrations, en cas d'incompatibilité
- L'administration continue ou prolongée doit être précédée d'une dose de charge

MOLECULE IVSE /POMPE	CONCENTRATION MAXIMALE APRES DILUTION	SOLUTE DE DILUTION	DOSE JOURNALIERE PRESCRITE	DILUTION ET ADMINISTRATION	COMMENTAIRES
PENICILLINE G POMPE en continu	100 000 U /ml	NaCl	20 MU	2 perfusions de 10 MU dans 100 cc sur 12h	Stable 12h à 25°
	100 000 U/ml	NaCl	30 MU	2 perfusion de 15 MU dans 150 cc sur 12h	Stable 12h à 25°
	100 000 U /ml	NaCl	40 MU	2 perfusion de 20 MU dans 200 cc sur 24h	Stable 12h à 25°
AMOXICILLINE* POMPE en continu	20 mg/ml	NaCl	6 g	3 perfusions de 2 g dans 100 cc sur 8h, Soit 2 g dans 100 cc sur 8h x 3/j	Stable 8h à 25°
	20 mg/ml	NaCl	9 g	3 perfusions de 3 g dans 150 cc sur 8h, Soit 3 g dans 150 cc sur 8h x 3/j	Stable 8h à 25°
	20 mg/ml	NaCl	12 g	3 perfusions de 4 g dans 200 cc sur 8h, Soit 4 g dans 200 cc sur 8h x 3/j	Stable 8h à 25°
CLOXACILLINE POMPE en continu	50 mg/ml	G5	6 g	1 perfusion de 6 g dans 120 cc sur 24h, Soit 6 g dans 120 cc sur 24h	Stable 24h à 23°
	50 mg/ml	G5	8 g	1 perfusion de 6 g dans 160 cc sur 24h, Soit 8 g dans 160 cc sur 24h	Stable 24h à 23°
	50 mg/ml	G5	10 g	1 perfusion de 10 g dans 200 cc sur 24h, Soit 6 g dans 200 cc sur 24h	Stable 24 h à 23°
	50 mg/ml	G5	12 g	1 perfusion de 12 g dans 240 cc sur 24h, Soit 12 g dans 240 cc sur 24h	Stable 24h à 25°
TEMOCILLINE IVSE continue	80 mg/ml	Eau PPI**	6 g	1 seringue de 6 g sur 24 h Soit 6 g dans une seringue de 48 cc, sur 24h	Stable 24h à température ambiante
TICARCILLINE IVSE continue	100 mg/ml	NaCl	15 g	3 seringues de 5 g sur 8h Soit 5 g dans chaque seringue de 48 cc, sur 8h x 3/j	Stable 24h à 24°
PIPERACILLINE IVSE continue	80 mg/ml	NaCl ou G5	12 g	3 seringues de 4 g sur 8h Soit 4 g dans chaque seringue de 48 cc, sur 8h	Stable 24h à 24°
	80 mg/ml	NaCl ou G5	16 g	4 seringues de 4 g sur 6h Soit 4 g dans chaque seringue de 48cc, sur 6h x 4/j	Stable 24h à 24°
PIPERACILLINE + TAZOBACTAM IVSE continue	80 mg/ml + 10 mg/ml	NaCl ou G5	12 g + 1,5 g	3 seringues de 4 g sur 8h Soit 4 g dans chaque seringue de 48 cc sur 8h x 3/j	Stable 24h à 25°

Causes évitables d'échec des AB et d'émergence de la résistance

- Inactivation avant administration par non respect des propriétés physico-chimiques
- Mauvaise prise en compte des propriétés PK/PD
- Incidents de perfusion en rapport avec l'incompatibilité

**Exigez de bonnes
prescriptions !**