


Poster V-01

CINETIQUE TCD4 CHEZ LES PATIENTS MONOINFECTES PAR LE VIH ET COINFECTES PAR LE VIH ET LE BAAR A BAMAKO, MALI

- **METHODOLOGIE**

- 2 populations d'étude:
 - 23 patients VIH+ en infectiologie
 - 23 patients VIH+/BAAR+en pneumologie
- Traitement antituberculeux 2 RHZE/6EH pour les Co-infectés
- Traitement ARV pour les 2 populations :
 - 2 NUC+ 1NNUC.
 - 3 NUC pour les cas de VIH 2 ou VIH1+VIH2
- Dosage des lymphocytes TCD4 à :
 - Jo inclusion
 - puis M1 ,M3, M6 après le début des ARV

CINETIQUE TCD4



DISCUSSION

- **similitude de cinétique de la moyenne des lymphocytes T CD4 entre ces 2 populations:**
 - régime ARV Semblable en majorité
 - antituberculeux identique
 - Bonne observance(DOT)
 - Absence de BAAR dans les expectorations M2
- **Différence pourrait être possible:**
 - dosage des TCD4 avant négativation des crachats pour les BAAR
 - Comparaison des valeurs absolues et analyse des facteurs de confusion possible: Age, co-morbidité etc.