



Montpellier

JNI 11^{es} Journées
Nationales
d'Infectiologie



Vaccination contre l'hépatite B chez les nourrissons : enquête téléphonique sur les connaissances, pratiques et opinions des médecins généralistes de l'est parisien en 2009.

Méthode:

Population

- médecins généralistes installés à Paris, Seine St Denis (93) et Val de Marne (94)
- Tirage au sort (excel: aléa)


Enquête téléphonique

- 1^o trimestre 2009
- Unique investigateur
- Procédures protocolisées

Questionnaire 18 items

- Caractéristiques sociodémographiques
- Connaissances
- Pratiques vaccinales
- Opinions

Epi Info 6.04, alpha 0,05



Inclusions

300 médecins appelés

- **206 inclusions**
- 30% femmes
- Âge moyen 54 (H) 49 (F)
- Pratique de MEP: 28%
- Prise en charge nourrissons: 86% (180)



Opinions des médecins concernant la vaccination HBV

N= 206	En général		Nourrisson	
	n	% [IC95%]	n	% [IC95%]
Pour	172	83,5 [77,7-88,3]	152	73,8 [67,2-79,7]
Contre	10	4,9 [2,4-8,7]	28	13,6 [9,2-19]
Réticent	24	11,7 [7,6-16,8]	26	12,6 [8,4-17,9]
Total	206		206	

Les médecins défavorables à la vaccination chez le nourrisson sont plutôt ($p < 0,05$)

- Plus âgés
- MEP
- Ne prennent pas en charge les nourrissons
- Ne connaissent pas les recommandations
- Ne connaissent pas l'existence de l'hexavalent



Montpellier



**Proposition de vacciner contre l'hépatite B : quelles populations concernées ?
(N=207)**

	Oui		Non	
	n	% [IC 95%]	n	% [IC 95%]
Groupes à risque	201	97,1 [93,8-98,9]	6	2,9 [1,1-6,2]
Adulte	41	19,8 [14,6-25,9]	166	80,2 [74,1-85,4]
Adolescent	124	59,9 [52,9-66,6]	83	40,1 [33,4-47,1]
Enfant	129	62,3 [55,3-68,9]	78	37,7 [31,1-44,7]
Nourrisson	134	64,7 [57,8-71,2]	73	35,3 [28,8-42,2]

En tenant compte uniquement des médecins prenant en charge des nourrissons (N=180)*

Proposent le vaccin aux nourrissons	134	74,4 [67,4-80,6]*	46	25,6 [18,4-31,4]
Suivi des recommandations	84	46,6 [38,7-53,2]	96	

En tenant compte uniquement des médecins prenant en charge des nourrissons et connaissant l'Hexavalent(N=116)

Ont modifié leur pratique depuis son remboursement	73	62,9 [54,1-71,7]	43	0,37 [28,2-45,8]
Ne le prescrivent que depuis son remboursement	60	51,7		
Le prescrivent davantage depuis son remboursement	13	11,2		