

**Recommandations sur la rougeole en 2011
(vaccination, immunoglobulines)
Haut Conseil de santé publique**

Christian Perronne

Infectiologie

Hôpital Universitaire Raymond Poincaré (AP-HP) 92 Garches

Université de Versailles – St Quentin en Yvelines

Haut Conseil de santé publique

Déclaration de conflits d'intérêts de 2009 à 2011

Christian PERRONNE

Absence de conflits d'intérêt

Engagement de la France dans l'élimination de la rougeole

OMS : 2015

Maladie éradicable

- Réservoir strictement humain

Objectif d'élimination atteint en 2002 dans certains pays

- Finlande, Amériques

Contraintes

- Niveau d'immunité de groupe ≥ 95 %, 2 doses

Elimination de la rougeole

- **Couverture vaccinale rougeole en France en 2008 : en progrès**
- **1^{ère} dose : augmentation de 85% à 95,7 %**
- **2^{ème} dose : 74,2 % (insuffisant), mais <50% dans certaines régions**

Élimination de la rougeole 2011

- **Région Europe de l'OMS** : plan d'élimination (rougeole + rubéole congénitale) reporté à **2015**

- **France : épidémie de rougeole +++**
 - Nourrissons < 1 an**
 - Adultes jeunes**
 - 2007 : 40 cas déclarés. 2008 : 604 cas
 - 2010 : plus de 5.000 cas
 - 1^{er} trimestre 2011 : près de 5.000 cas (1/3 des cas réels)

- **Objectif : 95% de couverture vaccinale pour les deux doses**

Vaccin Rougeole - Oreillons - Rubéole

- A 12 mois

+ **2ème dose** entre 13 et 24 mois
(intervalle minimum d'un mois)

Quand vacciner contre la rougeole dès 9 mois ?

Enfants vivant en collectivité

- ROR à 9 mois
- 2ème ROR 6 mois plus tard

Peut-on vacciner plus tôt contre la rougeole ?

On pourrait dès 6 mois

- **Dans ce cas, il faut réadministrer 2 doses supplémentaires à partir de 12 mois.**

Élimination de la rougeole 2011

• **Recommandations :**

- **Rattrapage des enfants et adolescents (contrôle des carnets de santé à l'école)**
- **Rattrapage des adultes jeunes (2 doses si né depuis 1980)**
- **Devant un ou plusieurs cas de rougeole :**
 - **Vaccination des cas contact (<72h) +++**
 - **Vérification du statut vaccinal de l'entourage ± mise à jour**

Quand vacciner un adulte contre la rougeole ?

- **Adolescents ou adultes nés à partir de 1980**
(notamment lors d'une consultation pré-conceptionnelle)

âgés de 31 ans ou moins

non vaccinés, sans antécédent de rougeole (ou si doute)

- **2 doses de ROR**

- **Personnels de santé (en formation ou en poste)**

de plus de 31 ans, **1 dose de ROR**

Utilisation des immunoglobulines en prophylaxie post-exposition de la rougeole

- **Immunoglobulines polyvalentes par voie IV**
(400 mg/kg en dose unique)
- **Dans les 6 jours qui suivent le contagage avec une rougeole confirmée**
- **Si doute sur les antécédents (rougeole ou vaccin), dans l'impossibilité d'obtenir un résultat de sérologie IgG en urgence (résultat qualitatif +++, ne pas tenir compte du titre des Ac)**

Indications des immunoglobulines en prophylaxie post-exposition de la rougeole

- **Femme enceinte** sans antécédent de rougeole ou de vaccin
- **Immunodéprimé** (sauf si traitement par Ig), quelques soient les antécédents de rougeole ou de vaccin
- **Nourrisson < 6 mois**
 - si absence d'Ac protecteurs maternels
(mère sans antécédent de rougeole ou de vaccin)
 - ou dont la mère fait la rougeole
- **Enfant de 6 à 11 mois,** non vacciné dans les 72 heures après le contage
- **Nouveau-né** dont la mère a commencé la rougeole dans les 10 jours précédant l'accouchement