



JNI

14^{es} Journées
Nationales
d'Infectiologie

Clermont-Ferrand
et l'interrégion Rhône-Alpes Auvergne

Du mercredi 12 au
vendredi 14 juin 2013
Polydome, centre d'expositions
et des congrès



ENQUÊTE D'ACCEPTABILITÉ DE LA VACCINATION ANTI-HPV

Matériel et Méthodes

COL07-05

- Il s'agit d'une étude épidémiologique, descriptive, prospective
- multicentrique (4 centres de vaccinations parisiens)
- période d'inclusion: octobre 2011 à mars 2012 (6 mois)

Déroulement de l'enquête:

- un auto-questionnaire anonyme est remis à chaque accompagnant lors de la 1^{ère} visite
- tous les questionnaires remis ont été inclus dans l'étude
- les données concernant les mères n'ont pu être reliées à celles de leurs filles du fait de l'anonymat

Limites de l'enquête:

- Absence d'association entre les caractéristiques des mères et des filles
- Etude uniquement descriptive
- Biais de recrutement: uniquement mères de jeunes filles vaccinées



Résultats

- 204 questionnaires inclus
- âge moyen des mères: 46 ans
- Population majoritairement née en Europe (35% dont 19% en France), avec une assurance maladie (non CMU, non AME): 42%, et un emploi (46%)

La majorité des mères:

- Sont déjà sensibilisées au cancer du col utérin
 - Sont déjà bien suivies par un MG et/ou un gynécologue: 60.8% ont 1 MT, 55% un gynécologue
 - Ont déjà eu un frottis cervico-vaginal dans les 3 dernières années: 53.4%
 - Pour celles âgées >50 ans, bien suivies pour le dépistage du cancer du sein: 93%
 - 11% des mères ont un ATCD d'anomalies cytologiques au FCV (vs 3-5% en population générale en France en 2012), 1.5% ont un ATCD personnel de cancer du col utérin, 2.5% un ATCD familial de cancer du col, 1.5% ont un ATCD personnel de cancer du sein, 2.5% un ATCD familial de cancer du sein
- En revanche seuls 40% sont à jour de leur vaccination DTP

Vaccination essentiellement **motivée par la peur du cancer (36.8%)**

Discussion

- **Effectif très faible:**
 - Enquête de courte durée: 6 mois
 - Faible taux de réponse aux courriers proposant la vaccination
- **Mission première des centres: prévention avec une attention particulière pour les sujets jeunes et/ou précaires**
 - Or, en majorité, foyer familial non précaire, bon niveau socio-économique
 - Entourage maternel bien informé sur le cancer du col
 - Ces adolescentes auraient sûrement bénéficié du vaccin même sans cette campagne (MG, gynécologue)
- **Comment toucher plus les jeunes femmes défavorisées?**