



**JNI** 15<sup>es</sup> Journées  
Nationales  
d'Infectiologie

Bordeaux  
et l'interrégion Aquitaine § Limousin




du mercredi 11 au vendredi 13 juin 2014  
Palais des Congrès de Bordeaux

# Epidémie de LGV anorectale en France: où en est-on 10 ans après?

## R-02

B. de Barbeyrac  
CNR des infections à chlamydiae


# Epidémie de LGV anorectale en France: où en est-on 10 ans après?



**125 cas**


# Circuit du réseau de surveillance: 2010

<http://www.cnrchlamydiae.u-bordeaux2.fr>




Genotypage par PCR spécifique L et L2b

## Evolution de la LGV en France entre 2002 et 2013



# Répartition géographique LGV (1795) / génovars non L (1290). France 2002- 2013



# Caractéristiques LGV en France

- Différences significatives entre LGV et anorectite à souches non L
  - Symptômes 97% vs 48%
  - VIH + 80% vs 33%
  - Syphilis 42% vs 22%
  - MSM 96% vs 91%
  - Multipartenaires > 5 50% vs 35%
    - Occasionnels 87% vs 74%

# LGV anorectale

- La surveillance doit se poursuivre car l'épidémie progresse
- La surveillance doit inclure les hétérosexuels; car un cas féminin a été décrit en France
- La surveillance doit aussi s'exercer sur les autres sites possibles (42 cas de LGV génitale avec adénopathie et 5 cas de portage pharyngé)