

Pratique du « slam » chez les HSH VIH+

- **Auteurs:**
 - T. L'Yavanc, R. Missonnier, M. Hamidi, N Velazquez, G Pialoux.
- **Slam = injection de drogues chez les gays en contexte sexuel**
- **Objectifs de l'étude:**
 - Objectif principal: évaluer la prévalence de la pratique du « slam » chez les HSH VIH+
 - Objectifs secondaires:
 - Décrire la population des « slameurs »
 - Décrire les toxiques utilisés par les slameurs.
- **Méthode:**
 - Étude monocentrique (SMIT Tenon), descriptive, déclarative.
 - Menée en 2013
 - Questionnaire « toxiques » a été ajouté au logiciel de consultation (DIAMM):
 - Quels toxiques avez vous déjà consommés?
 - 11 classes/toxiques interrogés
 - Pour chaque toxique déjà consommé:
 - » Consommation active ou sevrée?
 - » Si conso active: consommation intraveineuse ou autre?
 - Avez-vous déjà pratiqué le slam?
 - Oui ou Non
 - Le questionnaire réapparaissait à chaque consultation jusqu'à ce qu'il soit rempli.

Résultats (1/2): Prévalence du slam = 2,9%

NB: 84,9% des HSH VIH+ ont eu un questionnaire saisi

Paramètres	HSH non slameurs		HSH slameurs		p
	n = 1126	97,1%	n = 34	2,9%	
Nationalité					
France	918	81,5%	28	82,4%	NS
Autre	208	18,5%	6	17,6%	
Age (en années)					
Moins de 30	61	5,4%	2	5,9%	NS
30 à 50	614	54,5%	24	70,6%	
sup à 50	451	40,1%	8	23,5%	
Moyenne	48,80	(42,6 - 55)	44,10	(39,23 - 49,62)	0,00346
Durée de séropositivité (en années)					
0 à 10	375	33,3%	14	41,2%	NS
supérieure à 10	751	66,7%	20	58,8%	
moyenne	16,5	(7 - 22,9)	13,2	(5,28 - 20,92)	NS
Stade OMS					
A	851	75,6%	29	85,3%	NS
B	45	4,0%	1	2,9%	
C	230	20,4%	4	11,8%	
Nadir du taux de CD4					
0 à 199	400	35,5%	6	17,6%	0,0211
200 à 499	547	48,6%	17	50,0%	
500 ou plus	160	14,2%	11	32,4%	
moyenne	256	(135 - 408)	340	(232,5 - 534,25)	0,0134
Traitement antirétroviral					
non	31	2,8%	1	2,9%	NS
oui	1095	97,2%	33	97,1%	
Dernier taux de CD4					
0 à 199	27	2,4%		0,0%	NS
200 à 499	284	25,2%	8	23,5%	
500 ou plus	799	71,0%	26	76,5%	
moyenne	640	(478,25 - 835)	658,5	(505,5 - 799,25)	NS
Dernière charge virale VIH					
indétectable	917	81,4%	28	82,4%	NS
détectable	209	18,6%	6	17,6%	
Coinfection VHB (Ag HBs +)					
oui	80	7,1%		0,0%	NS
Coinfection VHC (ac anti VHC +)					
oui	89	7,9%	17	50,0%	3,97 e-10
Syphilis (TPHA positif)					
oui	246	21,8%	16	47,1%	0,00497

Résultat (2/2): toxiques activement consommés par les slameurs

Paramètres	HSH non slameurs		HSH slameurs		p
	n = 1126	97,1%	n = 34	2,9%	
Toxiques activement consommés					
Poppers	229	20,3%	20	58,8%	1,65 e-6
Cathinones	9	0,8%	14	41,2%	1,16 e-17
Cannabis	199	17,7%	12	35,3%	0,0208
Cocaïne	77	6,8%	11	32,4%	1,73 e-5
GHB GBL	26	2,3%	6	17,6%	0,000211
Ecstasy MDMA	36	3,2%	5	14,7%	0,00561
Amphetamines	3	0,3%	4	11,8%	2,03 e-5
Kétamine	10	0,9%	3	8,8%	0,00539
Crack	0	0,0%	2	5,9%	0,000835
LSD acides	1	0,1%	0	0,0%	NS
Héroïne	-	-	-	-	-
Toxiques activements consommés IV					
Cathinones	0	0,0%	9	26,5%	5,16 e-15
Amphetamines	0	0,0%	3	8,8%	2,31 e-5
Cocaïne	1	0,1%	3	8,8%	9,04 e-5
Kétamine	2	0,2%	2	5,9%	0,00482
Poppers	0	0,0%	1	2,9%	0,0293
Héroïne	-	-	-	-	-
LSD acides	-	-	-	-	-
Cannabis	-	-	-	-	-
Crack	-	-	-	-	-
Ecstasy MDMA	-	-	-	-	-
GHB GBL	-	-	-	-	-
Total (injecteurs actifs)	3	0,3%	10	29,4%	1,99 e-14