

# Info-antibio N° 32 : Janvier 2013

Lettre mensuelle d'information sur les antibiotiques.

**Moins prescrire d'antibiotiques, c'est préserver leur efficacité**

**Le bon usage des antibiotiques limite le développement des bactéries résistantes et préserve l'efficacité des antibiotiques...**

Cette lettre présente de manière synthétique des actualités ou mises au point concernant les antibiotiques. Elle est accessible gratuitement en inscrivant son mail [ICI](#). Les liens internet sont actifs et amènent à des documents accessibles sans restriction.

## Recommandations sur les antibiotiques issues d'autres pays en 2012

Ces guidelines ne sont pas forcément utilisables telles qu'elles en France compte tenu de différence dans l'épidémiologie bactérienne, la fréquence des résistances, le système de santé ou d'autres facteurs et doivent être analysés avec précautions.

Angines à Strepto A - diagnostic et prise en charge - IDSA - USA

[HTML](#) - [PDF](#)

Pénicilline ou amoxicilline en 1ère intention

Infections à gonocoque - addition aux recos IST de 2010: CDC - USA

[HTML](#)

Le céfixime en prise unique n'est plus recommandé d'emblée vu les niveaux de résistance

Sinusites bactériennes- IDSA - USA

[HTML](#) - [PDF](#)

En France, on recommande en 1ère intention: Pour les sinusites maxillaires 7 à 10 j d'amoxicilline, pour les autres sinusites, ou en cas d'échec, l'amoxicilline + acide clavulanique

Aux USA, le 1er choix est l'amoxicilline + acide clavulanique pendant 5 à 7 j pour toutes les sinusites

Vaginite bactérienne - BASHH - UK

[PDF](#)

Sepsis bactérien et grossesse - RCOG - UK

[Pendant la grossesse](#) (PDF) - [Après la grossesse](#) (PDF)

Infections du pied diabétique: IDSA - USA

[HTML](#) - [PDF](#)

Recommandations vaccinales 2012- CDC - USA

[Adultes](#) - [Enfants](#)

## Information antibiotiques 2012 ANSM

**Arrêt de commercialisation de:**

Acide fucidique iv (12/12/12)

Colimycine orale (30/7/12)

**Ruptures de stocks temporaire ou difficultés d'approvisionnement**, brèves ou prolongées (ayant pu compliquer la tâche des établissements quand à leur politique antibiotique)

Céfixime, fosfomycine trometamol, gentalline, Imipénème, myambutol et nétromicine

**Lettre aux professionnels**

- [Lévofloxacine \(TAVANIC®\). Modification des indications et mise à jour des informations relatives à la sécurité d'emploi - Lettre aux professionnels de santé](#)
- [Doribax® \(doripénème\) - Nouvelles recommandations sur la posologie, la durée de traitement et les précautions d'emploi chez les patients atteints de pneumonies nosocomiales](#)
- [PYOSTACINE® : modifications importantes des Autorisations de Mise sur le Marché des spécialités à l'issue d'une ré-évaluation du rapport bénéfice/risque par l'ANSM](#)
- [Minocycline : restriction d'utilisation en raison d'un risque de syndromes d'hypersensibilité graves et d'atteintes auto-immunes](#)
- [Nitrofurantoïne - Restriction d'utilisation en raison d'un risque de survenue d'effets indésirables graves hépatiques et pulmonaires](#)

Médecine et  
maladies infectieuses



## Sources d'information nationales sur l'utilisation des antibiotiques

Sociétés savantes : consensus et conférences d'experts : [Infectiologie.com](#)

[ANSM \(ex-AFSSAPS\)](#) : AMM des antibiotiques, surveillance des effets indésirables.

[Site sur les antibiotiques](#) du Ministère de la Santé

Sites régionaux d'information sur les antibiotiques : [Lorraine](#) - [Nord Pas de Calais](#) - [Pays de la Loire](#)

Évaluation des pratiques : [HAS](#) - [SPILF](#)

Un service du journal *Médecine et Maladies Infectieuses* & de la SPILF (Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française), membre de la Fédération Française d'Infectiologie. Rédigé par le Dr S. Alfandari.