

BEST OF 2008

INFECTIOLOGIE URINAIRE

9-2007 / 9-2008

François CARON
Infectiologie
CHU de Rouen

Recommandations de Bonnes Pratiques

④ IU de l'enfant - AFSSAPS 2007

Med Mal Infect 2007;37:645-663

www.afssaps.fr

④ IU de l'adulte - AFSSAPS 2008

Med Mal Infect 2008; sous presse

www.afssaps.fr

Epidémiologie

Community-onset genitourinary tract infection due to CTX-M-15-producing *Escherichia coli* among travelers to the Indian subcontinent in New Zealand.

IU hospitalisées en N^{lle} Zélande (2004-2006)

5 936 isolats d'*E. coli*

66 (1,1%) *E. coli* BLSE

38 (58%) IU nosocomiales

28 (42%) IU communautaires

14 (52%) hospitalisés ≤ 6 mois

27 (96%) IU symptomatiques

2 visiteurs d'hôpital (Chine, USA)

13 (48%) voyageurs ou immigrants

1 séjour en Europe

9 séjours en Inde
1 séjour au Bangladesh

9 CTX-M-15
1 BLSE non typée

Clin Infect Dis. 2008 Sep 1;47(5):689-92

Freeman JT, McBride SJ, Heffernan H, Bathgate T, Pope C, Ellis-Pegler RB, Auckland, N^{lle} ZELANDE

Best-Of 2008 - page 4

Community-onset genitourinary tract infection due to CTX-M-15-producing *Escherichia coli* among travelers to the Indian subcontinent in New Zealand.

BLSE-CTX-M-15

- ① 1ère description en Inde en 2000
- ① Taux élevé de portage de BLSE (7%) dans une population indienne
- ① Hypothèses :
 - faible hygiène hydrique
 - usage antibiotique vétérinaire
 - usage antibiotique humain « over the counter »

Clinique :
IU chez le greffé rénal
IU masculines

**Urinary tract infection due to *Corynebacterium urealyticum*
in kidney transplant recipients :
an underdiagnosed etiology for obstructive uropathy and graft
dysfunction - Results of a prospective cohort study**

163 greffés rénaux recrutés en 13 mois

**J1 : ECBU + écouvillonnage inguinal
milieux sélectifs – cultures prolongées**



Suivi des 25 patients à culture \oplus : urines (n=16) ou peau (n=22)

M1 à M6 : clinique, ECBU, +/- traitement

Colonisation / Infections urinaires à *C. urealyticum* chez 163 greffés rénaux

16 ECBU[⊕] *C. urealyticum* (=D2)



10 IU symptomatiques :

- 9 à J0 ; 1 à M1
- 9 cystites ; 1 pyélite / lithiase

10 traitements :

- 8 teico (100-400 mg/j im 14j)
- 2 vanco (20-40 mg/kg/j iv 14j)

3 rechutes (≤ 3 mois)



6 asymptomatiques

2 traitements (teico SAI)

Colonisation / infections urinaires à *C. urealyticum* chez des greffés rénaux

⌚ Fréquence :

- 9% (3% au seuil > 10⁵ ufc/ml)
- versus 0,1 – 0,3% dans la population générale
 - greffés rénaux = population à haut risque
 - screening systématique « probablement non indiqué »

⌚ Facteurs de risque :

- colonisation cutanée à *C. urealyticum* (OR : 208)
 - mais incidence trop faible pour un screening systématique
- néphrostomie (OR : 52) et autres manipulations
 - cause ou conséquence ?

⌚ Évolution :

- symptôme urinaire prolongé (OR : 28)
- uropathie obstructive (OR : 26)

IU à *C. urealyticum* : signes d'appel

- ⦿ IU chronique à ECBU conventionnel négatif
- ⦿ Hématurie / pyurie inexplicées
- ⦿ Urines alcalines (pH > 7)
- ⦿ Lithiase (struvite), uropathie obstructive, cystite ou pyélite encrassée

 alerter le laboratoire

Acute bacterial prostatitis: heterogeneity in diagnostic criteria and management. Retrospective multicentric analysis of 371 patients diagnosed with acute prostatitis

**CHU de Rouen et Dijon (1998-2003)
Urologie, Infectiologie, Médecine interne, Gériatrie
2 170 hommes admis pour IU**



586 (27%) diagnostic final de prostatite



**371 (63%) patients au dossier évaluable
pour une étude rétrospective**

Mode of contamination, medical history and symptoms of 371 patients with acute prostatitis

| | Total patients | Department of admission | | | |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------|-------------------|------------|
| | | Urology | Infectious Diseases | Internal Medicine | Geriatrics |
| | n = 371 | N = 178 | n = 115 | n = 48 | n = 30 |
| Mode of contamination | | | | | |
| Community-acquired | 293 (79%) | 140 (79%) | 91 (79%) | 41 (86%) | 21 (71%) |
| Nosocomial | 78 (21%) | 37 (21%) | 24 (21%) | 7 (14%) | 9 (29%) |
| Hospital acquisition | 58 (75%) | 26 (69%) | 18 (75%) | 5 (72%) | 8 (87%) |
| Outpatient with urinary catheter | 20 (25%) | 11(31%) | 6 (25%) | 2 (28%) | 1 (13%) |
| Medical history | | | | | |
| Medium Age (years) | 61 | 57 | 60 | 66 | 84 |
| Co-morbidities ≥ 2 | 26 (7%) | 3 (2%) | 2 (2%) | 15 (31%) | 7 (22%) |
| Clinical symptoms | | | | | |
| Fever | 297 (80%) | 154 (84%) | 86 (80%) | 38 (78%) | 19 (63%) |
| Chills | 135 (35%) | 47 (25%) | 60 (56%) | 14 (28%) | 7 (23%) |
| Urinary symptoms | 266 (72%) | 158 (86%) | 65 (60%) | 28 (57%) | 15 (50%) |
| Cognitive disorders | 14 (4%) | 0 (0%) | 5 (4%) | 4 (8%) | 10 (33%) |
| Miscellaneous symptoms | 28 (8%) | 0 (0%) | 2 (2%) | 21 (44%) | 7 (23%) |


Bacteriological results of urine cultures versus mode of contamination in a series of 371 acute prostatitis (AP)

| | Total patients n = 371 | Community-acquired AP n = 295 | Nosocomial AP n = 76 | Community-acquired <i>versus</i> nosocomial AP <i>p</i> value |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|
| Urine culture | 347 (94%) | 271 (92%) | 76 (100%) | 0.02 |
| Sterile | 122 (35%) | 96 (35%) | 29 (38%) | 0.71 |
| Positive | 225 (65%) | 178 (66%) | 47 (62%) | 0.71 |
| One strain | 196 (87%) | 159 (89%) | 37 (79%) | 0.09 |
| ≥ 2 strains | 29 (13%) | 19 (11%) | 10 (21%) | 0.09 |
| Isolated strains | 270 | 213 (72%) | 57 (75%) | ns |
| <i>E. coli</i> | | | | |
| All types | 157 (58%) | 142 (68%) | 15 (26%) | < 0.01 |
| Ampicillin-S | 95 (61%) | 88 (62%) | 7 (50%) | 0.4 |
| Nalidixic acid-S | 119 (76%) | 110 (78%) | 9 (57%) | 0.2 |
| Ofloxacin-S | 130 (83%) | 120 (85%) | 10 (64%) | 0.2 |
| Cotrimoxazole-S | 122 (78%) | 115 (81%) | 7 (43%) | < 0.01 |
| Proteus | 16 (6%) | 11 (5%) | 5 (9%) | 0.5 |
| KES group | 24 (9%) | 18 (8%) | 6 (11%) | 0.8 |
| <i>Enterococcus</i> | 16 (6%) | 8 (4%) | 8 (14%) | 0.02 |
| <i>P. aeruginosa</i> | 20 (7%) | 8 (4%) | 12 (21%) | < 0.01 |
| <i>S. aureus</i> | 8 (3%) | 3 (1%) | 5 (9%) | 0.02 |
| Others | 29 (11%) | 23 (11%) | 6 (11%) | 0.9 |

Antibiotic treatment and rates of failure for 371 acute prostatitis (AP)

| 371 AP patients | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| | Total patients n = 371 | Community acquired AP n = 293 | Nosocomial AP n = 78 | Community acquired Versus nosocomial AP p value | Urology n = 178 | Infectious Diseases n = 115 | Internal Medicine n = 48 | Geriatrics n = 30 |
| Antibiotic treatment | | | | | | | | |
| Empirical choice | | | | | | | | |
| ___ Bi-therapy | 215 (58%) | 172 (59%) | 43 (55%) | 0.7 | 123 (69%) | 63 (55%) | 20 (42%) | 9 (30%) |
| ___ Use of fluoroquinolone | 234 (63%) | 187 (64%) | 47 (60%) | 0.7 | 148 (83%) | 47 (41%) | 20 (42%) | 19 (63%) |
| ___ Use of 3 rd generation cephalosporin | 113 (30%) | 85 (29%) | 28 (36%) | 0.3 | 25 (14%) | 59 (51%) | 22 (46%) | 7 (23%) |
| ___ Use of amino glycosides | 195 (52%) | 165 (56%) | 30 (38%) | 0.007 | 120 (67%) | 60 (52%) | 14 (29%) | 1 (3%) |
| ___ Use of other classes | 44 (12%) | 28 (10%) | 16 (21%) | 0.01 | 8 (4%) | 12 (10%) | 12 (25%) | 12 (40%) |
| Inadequate* | 42/269 (16%) | 17/210 (8%) | 25/59 (42%) | <0.001 | 27/137 (20%) | 4/76 (5%) | 6/31 (19%) | 5/25 (25%) |
| Adapted choice | | | | | | | | |
| ___ Bi-therapy | 15 (4%) | 13 (4%) | 2(3%) | 0.7 | 3 (2%) | 11 (10%) | 0 (0%) | 1 (3%) |
| ___ Use of fluoroquinolone | 285 (77%) | 242 (82%) | 43 (55%) | <0.001 | 148 (83%) | 85 (74%) | 31 (65%) | 21 (70%) |
| ___ Use of 3 rd generation cephalosporin | 18 (5%) | 11 (4%) | 7 (9%) | 0.1 | 9 (5%) | 1 (1%) | 5 (10%) | 3 (10%) |
| ___ Use of cotrimoxazole | 52 (14%) | 44 (15%) | 8 (10%) | <0.001 | 13 (7%) | 33 (29%) | 5 (10%) | 1 (3%) |
| ___ Use of other classes | 31 (8%) | 9 (3%) | 22 (28%) | <0.001 | 11 (6%) | 7 (6%) | 7 (15%) | 6 (20%) |
| Inadequate* | 18/269 (7%) | 11/210 (5%) | 7/59 (12%) | 0.1 | 14/137 (10%) | 1/76 (1%) | 1/31 (3%) | 2/25 (8%) |
| Total duration (days) | 32 | 34 | 29 | 0.13 | 22 | 49 | 33 | 33 |
| Bacterial failure at follow-up | 37/153 (24%) | 23/124 (19%) | 14/29 (48%) | 0.002 | 16/76 (21%) | 2/32 (6%) | 1/6 (16%) | 4/9 (44%) |
| ___ - same strain | 7 | 3 | 4 | | 8 | 0 | 0 | 0 |
| ___ - other strain | 30 | 20 | 10 | | 8 | 2 | 1 | 4 |
| Clinical failure at follow-up | 137/183 (75%) | 98/135 (73%) | 39/48 (83%) | 0.3 | 88/123 (71%) | 28/36 (78%) | 8/10 (80%) | 13/14 (92%) |

Acute bacterial prostatitis in Korea : clinical outcome, including symptoms, management, microbiology and course of disease



Prostatites aiguës en urologie : gravité majorée en cas de manœuvre préalable sur l'arbre urinaire

| | avec manœuvre | sans manœuvre | <i>p</i> |
|-------------------------|---------------|---------------|----------|
| Fièvre | 79% | 65% | 0,0005 |
| Douleurs | 58% | 45% | 0,01 |
| <i>E. coli</i> | 46% | 55% | 0,35 |
| <i>Pseudomonas spp.</i> | 31% | 8% | 0,001 |
| C3G S | 79% | 84% | 0,66 |
| Cipro S | 53% | 80% | 0,04 |
| Tobra S | 67% | 91% | 0,04 |
| Abcédation | 14% | 3% | 0,001 |
| Rechute | 14% | 8% | 0,09 |
| Chronicisation | 11% | 7% | 0,37 |

Prévention : IU nosocomiales

Nonpayment for harms resulting from medical care: catheter-associated urinary tract infections

JAMA®

Box. Hospital-Acquired Conditions Selected for Fiscal Year 2008 Final Rule (In Rank Order)

Serious preventable event—object left in place during surgery

Serious preventable event—air embolism

Serious preventable event—blood incompatibility

Catheter-associated urinary tract infections

Pressure ulcers (decubitus ulcers)

Vascular catheter-associated infection

Surgical site infection—mediastinitis after coronary artery bypass graft surgery

Hospital-acquired injuries—fractures, dislocations, intracranial injury, crushing injury, burn, and other unspecified effects of external causes

From Centers for Medicare & Medicaid Services.³

① «First, do not arm»

② Paradoxe du remboursement
aux hôpitaux des frais des
complications



③ «First, do not pay for arm»

JAMA. 2007;298(23):2782-2784

Heidi L. Wald; Andrew M. Kramer, Denver - USA

Nonpayment for Harms Resulting From Medical Care: Catheter-Associated Urinary Tract Infections



④ IU/SAD, priorité d'action car :

- grande fréquence
- coût élevé (> 1 000 \$ / épisode)
- codage aisé
- recommandations de prévention (CDC 1981)

④ Changement attendu de la vision des cliniciens et hôpitaux :

- de la conséquence inévitable de l'hospitalisation...
- ...au dommage inacceptable résultant des soins

④ Système imparfait :

- des IU/SAD authentiquement inévitables (urologie...)
- un risque de sur-dépistage (importation vs acquisition) et de sur-traitement (décolonisation)

Preventing hospital-acquired urinary tract infection in the United States : a national study

- ① **Enquête auprès de 719 hôpitaux américains,**
- ① **Questionnaire adressé au « CLIN/EOH »**
- ① **72% de réponse**
- ① **État des lieux préoccupant :**
 - relevé de la présence d'une SAD **44%**
 - relevé de la durée du sondage **26%**
 - « cathéter reminders » ou « stop-order » **9%**
 - étui pénien régulier **14%**
 - « bladder scan » régulier **30%**
 - cathéter imprégné d'antibiotique **30% [bénéfice controversé]**
 - antibiotique dans le sac **3% [non recommandé]**

Clinical Infectious Diseases 2008;46:243-50

Emergency room staff education and use of a urinary catheter indication sheet improves appropriate use of foley catheters

Une simple feuille
attachée à chaque
emballage de SAD...

... et l'éducation qui va avec :
ça marche !


Indication Sheet for ordering a Foley Catheter

Please read the following criteria for appropriate use of Foley catheters and circle your reason for ordering the Foley catheter for this patient.

1. Obstruction of the urinary tract distal to the bladder
2. Alteration in the blood pressure or volume status requiring continuous, accurate urine volume measurement
3. A need to measure urine output accurately in an uncooperative patient (e.g., Intoxication).
4. Preoperative catheter insertion for patients going directly to the operating room
5. Continuous bladder irrigation for urinary tract hemorrhage
6. Urinary incontinence posing a risk to the patient (e.g., major skin breakdown or protection of nearby operative site)
7. To permit urinary drainage in patients with neurogenic bladder dysfunction and urinary retention
8. Palliative care for terminally ill

IF YOUR REASON FOR ORDERING A FOLEY IS NOT LISTED ABOVE, A FOLEY CATHETER
MAY NOT BE INDICATED FOR THIS PATIENT.

The reason I think this patient needs a Foley catheter is:



à activité constante

Am J Infect Control 2007;35:589-93.

Du fait d'un désistement de dernière minute,
un poste de CCA est disponible
dans le service des maladies infectieuses et tropicales
du CHU de Rouen
à compter du 1er novembre 2008.

Contact : Francois.Caron@chu-rouen.fr