Clostridium difficile

Actualités méthodes diagnostiques et épidémiologie

Pr Frédéric LAURENT

Institut des Agents Infectieux – Département de bactériologie - Hospices Civils de Lyon
Centre International de Recherche en Infectiologie (CIRI), INSERM U1111 – Lyon
Institut des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques de Lyon (ISPBL) – Lyon

Déclaration de liens d'intérêts de 2013 à 2017

- **Grants scientifiques : Alère, Astellas, Pfizer, bioMérieux, Becton Dickinson, Hologic, Sanofi, Biofilm Control, Pherecydes, ThermoFisher**
- **Liens durables ou permanents : Aucun**
- **Interventions ponctuelles : Novartis, Alère, Biofilm Control, MSD, Astellas, Cepheid**
- **Intérêts indirects : Aucun**

Clostridium

- Large famille (> 100 espèces)
- Gram + (violet)
- Producteur de spores (important !)
- Anaérobie stricte (O₂: toxic)

Le bon, le mauvais, et le meilleur..!

- Le bon : *C. acetobutylicum* = Biofuel
- Le mauvais: *C. difficile* = HAI
- Le magnifique: *C. botulinum* = Botox

Clostridium difficile

Etude (intrahospital, Maison de retraite, Admission)	Taux	Echantillons
Guerrero et al. <i>J Hosp Infect.</i> 2013; 85(2):155-8	12.0 %	146
Clabots et al. <i>J Infect Dis</i> 1992; 166:561–567	19.6 %	634
Ziakas et al., 2015 <i>PLoS ONE</i> 10(2):e0117195.	14.8 %	1371
Curry et al. <i>Clin Infect Dis.</i> 2013; 57(8):1094-1102.	10.4 %	3006
Dumford et al. <i>J of Spinal Cord Med</i> 2011; 34: 22-27	50.0 %	22
Eyre et al. <i>PLOS One</i> 2013; 8 (11) e78445	14.0 %	132
Riggs MM, <i>Clin Infect Dis</i> 2007; 45:992– 998	35.0 %	68
Leekha et al., 2013	9.8 %	320
Koo et al. <i>Infect Control Hosp Epid</i> 2014;35(6):667-73.	12.9 %	101
Loo et al., 2011, <i>N Engl J Med</i> 365: 1693–1703.	7.4 %	4143
Wei et al. 2015; <i>J Microbiol, Immunol & Infect</i> 48, 65 - 71	19.0 %	149
Alasmari et al. <i>Clin Infect Dis.</i> 2014; 15;59(2):216-22.	15.0 %	259
Ryan et al., <i>Ir J Med Sci.</i> 2010 Jun;179(2):245-50.	10.0 %	100
Donskey et al. <i>JCM</i> 2014; 52(1): 315 - 318	15.0 %	141
Zacharioudakis et al, <i>Am J. Gastro</i> 2015; 110: 381 - 390	8.1 %	8725
Nissle et al., <i>DGG, Congress, 3.5th of September 2015</i>	16.9 %	255

► **Moyenne: 16,8 %**

*Métanalyses de 47 études
incluant 19.358
échantillons*

► **Haut taux de portage
asymptomatique**

Clostridium difficile toxinogène

Flore intestinale normale

Intestin après ATB

***C. diff* trouve un coin sympa**

Infection à *C. diff*

Rappels physiopathologiques

Johnson S et al, *Clin Infect Dis* 1998
Pepin J et al, *CMAJ* 2004 ; INSPQ, 2005

Poutanen S., *CMAJ* 2004, 171, 51-58

Kyne, L. et al. *Lancet*, 2001 357 189-193
Kyne, L., *N EJM* 2000, 342, 390-397.

Rappels physiopathologiques

10-25% des diarrhées simples post-antibiotiques
10% des diarrhées nosocomiales

95% des CPM

Complications:

- . Mégacôlon toxique
- . Perforation dig.
- . Choc septique
- . Colectomie

Récidives : env. 20-25%

Rappels physiopathologiques

- Souches non-productrices de toxines = non pathogènes
- Souches productrices de toxines = pathogènes
 - ✓ toxine A = « entérotoxine » = TcdA
 - ✓ Toxine B = « cytotoxine » = TcdB
 - ✓ Inhibiteur de la transcription des toxines = tcdC
 - ✓ Toxine binaire = cdtA/cdtB

Figure 1. Major Genes in the Pathogenicity Locus (PaLoc) of *Clostridium difficile* and Relation to the Genes for Binary Toxin.

Rappels physiopathologiques

Shen A, *J Innate Immun* 2012;4:149–158

Définition d'une ICD

Définition :

- combinaison de signes cliniques et de symptômes, **confirmés** par la preuve microbiologique de toxines de *C. difficile* et d'une souche toxino-gène dans les selles, en l'absence d'autre cause
- ou la présence d'une colite pseudomembrane

ORIGINAL ARTICLE

10.1111/1469-0691.12418

European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases: update of the treatment guidance document for *Clostridium difficile* infection

S. B. Debast¹, M. P. Bauer², E. J. Kuijper³, on behalf of the Committee*

1) Department of Medical Microbiology, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Departments of 2) Infectious Diseases and 3) Medical Microbiology, Centre for Infectious Diseases, Leiden University Medical Centre, Leiden, the Netherlands

Poids des ICD en Europe et aux Etats-unis

• Etats-Unis

- 453 000 ICD/an¹
(IC 95% 397 100 – 508 500, HA et CO, HA ≥ 4 j, tous ES)
- 29 300 décès
- 1^{er} agent responsable d'IAS (12,5%)²
- Menace urgente (CDC)

• Europe

- 124 000 ICD/an
(IC 95% 61 000 – 285 000, HA=CDI ≥ 3 j, ES court séjour)
- Mortalité attribuable: 3%
(3 700 décès attrib./an)
- 8^{ème} agent responsable d'IAS (5,4%)³

¹Lessa , NEJM 2015, 372, 825; ² Magill SS, NEJM 2014; 370, 1198-208

³<http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/publications/healthcare-associated-infections-antimicrobial-use-pps.pdf>

Origine des cas d'ICD

82% des patients avec CA CDI déclarent avoir une relation avec le système de santé (MG, cabinet dentaire) dans les 12 semaines précédentes

15,461 cas d'ICD dans 10 régions géographiques

■ CA-CDI ■ Post discharge ■ Hospital onset ■ Nursing home onset

509 Cas d'ICD dans 34 pays européens

■ HCA-CDI ■ CA-CDI ■ Indeterminate

¹Lessa, NEJM 2015, 372, 825; ²Bauer et al. Lancet 2011;377:63-73

Les ICD communautaires sont de plus en plus fréquentes

Pays Bas

- 12 714 selles diarrhéiques (prescrites par MG)¹
 - 1.5% positives en culture toxigénique
 - 7% des recherches prescrites par MG (40% ICD détectées)
- Performance des algorithmes en médecine générale

Test algorithm in diarrheal samples from the community	Setting	Patients tested (% of all unformed stools)	Positive results (% of all tested samples)	Detection of CDI (% of all tested positive)
> 65 y, after AB use or hospitalization	UK 2012	31	3.5	72

France

Prevalence of CD and enteric pathogens

Variables	p
Antibiotics in the previous 30 days	<0.0001
Hospitalization in the previous 3 months	0,001

Epidémiologie moléculaire des ICD : très variable d'un pays à un autre ...

USA 2011

Europe 2012-2013

Epidémiologie moléculaire des ICD : très variable d'un pays à un autre ...

Dissémination mondiale du clone 027/BI/NAP1

Evolution de l'incidence des ICD, Données européennes

- L'incidence a augmenté dans de nombreux pays^{1-4, 6-7}
 - Meilleure sensibilisation au diagnostic
 - Amélioration des techniques diagnostiques (PCR)
 - Diffusion du clone 027

1. Lyytikäinen et al. Emerg Infect Dis 2009;15:761-5;
2. Søres et al. Euro Surveill 2009;14:pii19176;
3. Soler et al. Infect Control Hosp Epidemiol 2008;29:887-9;

4. Vonberg et al. Emerg Infect Dis 2007;13:179-80;
6- Bauer et al. Lancet 2011;377:63-73.
7. Davies, Lancet Inf. Dis 2014, 14, 1208-19

Importance de diagnostiquer vite et bien !

Recommandations

Contents lists available at ScienceDirect

Clinical Microbiology and Infection

journal homepage: www.clinicalmicrobiologyandinfection.com

2016

European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases:
update of the diagnostic guidance document for *Clostridium*
difficile infection

M.J.T. Crobach¹, T. Planché⁴, C. Eckert⁵, F. Barbut⁵, E.M. Terveer¹, O.M. Dekkers^{2,3},
M.H. Wilcox⁶, E.J. Kuijper^{1,2}

SHEA-IDSA GUIDELINE

Clinical Practice Guidelines for *Clostridium difficile*
Infection in Adults: 2010 Update by the Society for Healthcare
Epidemiology of America (SHEA) and the Infectious Diseases
Society of America (IDSA)

Stuart H. Cohen, MD; Dale N. Gerding, MD; Stuart Johnson, MD; Claran P. Kelly, MD; Vivian G. Loo, MD;
L. Clifford McDonald, MD; Jacques Pepin, MD; Mark H. Wilcox, MD

2010

A Practical Guidance Document for the Laboratory Detection of
Toxigenic *Clostridium difficile*
September 21, 2010*

The American Journal of Gastroenterology **108**, 478-498 (April 2013) | doi

Guidelines for Diagnosis, Treatment, and
Prevention of *Clostridium difficile* Infections

CLINICAL GUIDELINES

Australasian Society for Infectious Diseases guidelines for the
diagnosis and treatment of *Clostridium difficile* infection

Allen C Cheng, John K Ferguson, Michael J Richards, Jennifer M Robson, Gwendolyn L Gilbert,
Alistair McGregor, Sally Roberts, Tony M Korman and Thomas V Riley

2011

Diagnostic microbiologique des ICD

Plus on cherche, plus ... on diagnostique

France

Médiane = 29 pour 10,000 patients-jours ; IQR=19–50

FIGURE 2

Relation entre la densité de prescription de *Clostridium difficile* (nombre de recherche de *C. difficile*/10 000 patients-jours) et l'incidence d'infections à *C. difficile* (ICD) (nombre d'ICD/10 000 patient-jours)

Prévalence des infections à *Clostridium difficile* chez les patients hospitalisés avec une diarrhée : résultats d'une étude française prospective multicentrique²²

Diagnostic microbiologique des ICD

Plus on cherche, plus ... on diagnostique

- Analyse de 651 selles (70 ES) par le CNR (étude EUCLID)
 - Méthode : screening (GDH+toxine) - confirmation : culture toxigénique
 - 9.7% des échantillons positifs à *C. difficile* tox (n=90)
- **55.6% des ICD NON diagnostiquées par l'ES car**
 - défaut de sensibilité de la méthode de diagnostic = résultat faux négatif (25.4%)
 - manque de sensibilisation des cliniciens = selles non testées (30.2%)

France

Soit **50,6%** des ICDs non diagnostiquées entre **4160 et 6935 ICD** non diagnostiquées en un an

Prévalence des infections à *Clostridium difficile* chez les patients hospitalisés avec une diarrhée : résultats d'une étude française prospective multicentrique^{2*}

Comment bien chercher ?

1. Seules les selles diarrhéiques doivent être testées

- Laboratoire : selles prenant l'aspect du récipient
- Patient diarrhéique :
 - Aspect 5, 6, 7 sur l'échelle de Bristol
 - ≥ 3 selles par 24 h ou moins ou émissions plus fréquentes que d'habitude (définition OMS)

2. Ne pas tester les selles des enfants de < 3 ans

- Colonisation asymptomatique fréquente chez les nouveaux-nés (6 mois -1 an)
- Le portage diminue progressivement
- Ne rechercher que sur demande du clinicien

Recommandations générales

3- Ne pas répéter les tests

- Pratique fréquente (13% des EIA négatifs testés deux fois sur une période de 7 jours) et coûteuse ¹
- Gain diagnostic faible (résultat négatif qui devient positif) ¹
- Répéter un test peut conduire à un résultat faux positif (défaut de spécificité) ²

Auteurs	Technique	Patients (n)	Gain diagnostique
Aichinger et al. 2008 ¹	EIA A + B, PCR	5,788 2,827	1.9% (7 days) 1.7% (7 days)
Renshaw et al. 1996 ²	CTA	2,009	1%

EIA, enzyme immunoassay;
PCR, polymerase chain reaction
CTA: test de cytotoxicité des selles

1. Aichinger *et al.* JCM 2008
2. Renshaw et al. Arch Pathol Lab Med 1996;120:49–52
3. Litvin *et al* ICHE 2009

Recommandations générales

4. Ne pas réaliser de contrôles microbiologiques de guérison¹

- Spores détectables chez **7%** (2/28) des patients à la fin du traitement²
- Culture positive chez **56%** (15/27) des patients 1-4 semaines après l'arrêt du traitement²

1. Crobach *et al.* Clin Microbiol Infect 2009

2. Sethi *et al.* Infect Control Hosp Epidemiol 2010

Recommandations générales

5- Prélever les selles avant de démarrer le traitement

- 51 patients avec ICD
- Répétition quotidienne du test après début du traitement
- 14%, 35%, et 45% des tests sont devenus négatifs (PCR) après respectivement 1, 2, et 3 jours de traitement

Comment réduire la fréquence de selles inappropriées?

- **Fréquence de selles inappropriées : encore très élevée**
 - 36% des patients testés n'avaient pas les critères de diarrhée¹
 - 19%, laxatif dans les 48h précédant le prélèvement (Kundrapu *et al*, Idweek 2014)

Risque de

- . ne pas traiter des patients infectés (et disséminateur!)
- . traiter des patients colonisés

Sample selection

Go

- We recommend that CDI testing should not be limited to samples with a specific physician's request. (Strong recommendation, high-quality evidence)
- We suggest that at least all submitted unformed stool samples from patients 3 years or older should be tested for CDI. (Weak recommendation, low-quality evidence)
- We suggest to limit testing of samples from children under age 3 to samples with a physician's request only. (Weak recommendation, low-quality evidence)
- Formed stool samples should not be tested for CDI (except in case of paralytic ileus). (Good practice statement)
- In patients suspected of ileus, a rectal swab can be used for (toxigenic) culture, NAAT or GDH EIA. (Strong recommendation, moderate-quality evidence)

Mieux on cherche, plus ... on diagnostique

- Analyse de 651 selles (70 ES) par le CNR (étude EUCLID)
 - Méthode : screening (GDH+toxine) - confirmation : culture toxigénique
 - 9.7% des échantillons positifs à *C. difficile* tox (n=90)
- **55.6% des ICD NON diagnostiquées par l'ES car**
 - **défaut de sensibilité de la méthode de diagnostic = résultat faux négatif (25.4%)**
 - **manque de sensibilisation des cliniciens = selles non testées (30.2%)**

Prévalence des infections à *Clostridium difficile* chez les patients hospitalisés avec une diarrhée : résultats d'une étude française prospective multicentrique^{2*}

Diagnostic des ICD : les défis actuels

- **Les méthodes diagnostiques ont évolué ces 10 dernières années**
- **Un diagnostic rapide et précis est essentiel pour :**
 - Prise en charge du patient
 - Prévention de la transmission nosocomiale
 - Données épidémiologiques fiables
- **Les critères idéaux pour une méthode de diagnostic :**
 - Spécificité
 - Sensibilité
 - Rapidité
 - Faible coût
 - Simplicité (minimum de manipulation)

Faire le diagnostic d'ICD

Diagnostiquer **vite** et **bien** :

- **Traitement adapté** pour réduire
 - la mortalité associée
 - la morbidité
 - les récurrences
 - les surcoûts

adapté = à l'ICD et au patient

mais aussi à la sévérité de l'ICD

quels marqueurs ?

mais aussi au risque de récurrence de l'ICD

quels marqueurs ?

- Isolement pour **limiter la transmission** :
 - isolement
 - décontamination spécifique : Anioxy spray

Importance de diagnostiquer vite et bien !

Traitements différenciés en fonction de la sévérité de l'ICD

Importance de diagnostiquer vite et bien !

Durée d'hospitalisation et coût des ICD

- Surcoût et durée d'hospitalisation liée aux ICD ¹

	Durée d'hospitalisation /épisode (jour)	Coûts d'hospitalisation/ épisode	N études
ICD Nosocomiale <i>médiane (range)</i>	7 j (2.7-21.3)	US\$ 9,298 (2,992-29-000)	10 études
Patients admis pour ICD <i>médiane (range)</i>	7 j (5-13.6)	US\$ 10,156 (6,771-10,212),	7 études

France (étude ECODIFF) ² :

ICD diagnostic associé : + 8.9 j (médiane € 8822; moyenne € 11251)
ICD diagnostic principal: + 10.7 j (médiane € 4410: moyenne 6056 €)

1. Gabriel L. *et al.*, JHI 2014, 88, 12-21
2. Le Monnier *et al.*, JHI 2015, 91, 117-122

Importance de diagnostiquer vite et bien !

ICD associées à un risque de mortalité

Données françaises

Kaplan Meier survival curves of patients and matched controls

95% confidence interval

- › Base EGB (Echantillon Généraliste de Bénéficiaires)
- › 482 patients avec ICD
- › 964 témoins sans ICD appariés sur age, sexe, comorbidités et durée de séjour
- › Analyse de survie de Kaplan Meier
- › Modèle de régression multivariée de Cox est utilisé pour comparer le risque de décès après ajustement sur score de propension

Importance de diagnostiquer vite et bien !

ICD associées à un taux élevé de réadmission

Données françaises

	Cas (n=484)	Témoins (n=964)	p-value
Patients ré-admis dans l'année qui suit	253 (52.5%)	397 (41.2%)	<0.0001
Nombre de ré-admissions			
Moyenne (standard deviation)	5.5 (11.3)	3.2 (7.1)	<0.0001
1	98 (38.7%)	209 (52.6%)	
2	48 (19.0%)	81 (20.4%)	
3	26 (10.3%)	35 (8.8%)	0.0003
[3,10]	50 (19.8%)	52 (13.1%)	
>10	31 (12.3%)	20 (5.0%)	
Durée cumulative de réhospitalisation			
Moyenne (standard deviation)	28.6 (45.8)	16.7 (40.4)	<0.0001

Diagnostic des ICD

2 méthodes de référence

Test de cytotoxicité des selles (CTA)

Toxine libre (toxine B et A)

Très spécifique

⇒ **signe la maladie**

moins sensible

CPM chez 11% de pts sans toxine libre (CTA-) 3
CTA + chez seulement 48% de 56 patients ayant
une CPM¹

Cible différente

Culture toxigénique (CT)

Souche toxigène

Très sensible

moins spécifique

⇒ **Colonisation ou infection?**

Portage fréquent de *C. difficile* à l'hôpital²

La **diarrhée peut être fréquente** (laxatifs,
norovirus, ATB...)

1. Johal *et al.* Gut 2004
2. Loo *et al.*, N Engl J Med 2011
3. Gerding *et al.* Arch Intern Med 1986

Différentes méthodes, différents objectifs

Les méthodes moléculaires

Illumigene® C. difficile
Meridian Bioscience

Amplification isotherme en boucle LAMP

tcdA

AmpliVue InGen®

Amplification isotherme hélicase-dépendante (Biohelix®)

Plusieurs cibles C. difficile

IMDx C. difficile for Abbott m2000
(tcdA et tcdB)
IntelligentMDx

Verigene® C. difficile Test
(tcdA, tcdB, PCR-ribotype 027)
Nanoshere

GenoType Cdiff
(tcdA, tcdB, plusieurs délétions tcdC, dont la délétion en position 117, cdtA, cdtB, gyr)
Hain lifescience

Xpert® C. difficile
(tcdB, cdt, deletion en 117, Cycles)
Cepheid

RIDA®GENE Clostridium difficile & Toxin A/B
(tcdA, tcdB, C. difficile)
R-Biopharm

Simplexa™ C. difficile Universal Direct
FOCUS Diagnostics

BD GeneOhm™ Cdiff Assay
BD

Cobas® Cdiff
Roche

BD MAX™ Cdiff
BD

Portrait Toxicigen C. difficile Assay
Portrait, Great Basin

Amplification isotherme hélicase-dépendante

Prodesse ProGastro Cd assay
Gen-Probe

tcdB

Plusieurs pathogènes

xTAG® Gastrointestinal Pathogen Panel
Luminex

Seeplex® Diarrhea ACE Detection
Seegene

FilmArray® Gastrointestinal Panel
Biomérieux

Performances des tests comparées aux méthodes de référence

Type	Comparé au CTA			Comparé à la CT			Comparé à la culture			
	Nombre études	Sensibilité (95% IC)	Spécificité (95% IC)	Nombre études	Sensibilité (95% IC)	Spécificité (95% IC)	Nombre études	Sensibilité (95% IC)	Spécificité (95% IC)	
IEA GDH	total	12	0.94 (0.89-0.97)	0.90 (0.88-0.92)	8	0.96 (0.86-0.99)	0.96 (0.91-0.98)	11	0.94 (0.86-0.97)	0.96 (0.92-0.98)
	en puits	5	0.94 (0.91-0.97)	0.92 (0.92-0.93)	1	0.94 (0.93-0.96)	0.94 (0.94-0.95)	4	0.89 (0.86-0.91)	0.91 (0.90-0.92)
	sur membrane	7	0.98 (0.78-1.00)	0.90 (0.87-0.93)	7	0.97 (0.84-1.00)	0.96 (0.90-0.99)	7	0.93 (0.84-0.97)	0.98 (0.95-0.99)
IEA toxines A/B	total	27	0.83 (0.76-0.88)	0.99 (0.98-0.99)	29	0.57 (0.51-0.63)	0.99 (0.98-0.99)			
	en puits	18	0.85 (0.77-0.91)	0.98 (0.96-0.99)	16	0.60 (0.52-0.68)	0.98 (0.97-0.99)			
	sur membrane	9	0.79 (0.66-0.88)	0.99 (0.98-0.99)	13	0.53 (0.45-0.61)	0.99 (0.97-1.00)			
Méthode moléculaire	total	14	0.96 (0.93-0.98)	0.94 (0.93-0.95)	32	0.95 (0.92-0.97)	0.98 (0.97-0.99)			

IEA : test immuno-enzymatique; IC : intervalle de confiance

Performances des tests comparées aux méthodes de référence

Dans le cadre du diagnostic d'infection ICD (hors portage)

Technique PCR = VPN +++

Recherche toxine = VPP +++

Recommandations de l'ESCMID 2016

Combiner pour mieux diagnostiquer !

Catégorisation des algorithmes de diagnostic des ICD

	Test de dépistage	Test de confirmation
Optimale	Méthode moléculaire	Détection des toxines (EIA)
	GDH et détection des toxines (EIA)	Méthode moléculaire ou culture toxigénique
Sub-optimale	GDH	Méthode moléculaire ou culture toxigénique
	Méthode moléculaire	Aucun
Incomplète	Autres algorithmes	

Mieux on cherche, plus ... on diagnostique

TABLEAU II

Description des stratégies de diagnostic des infections à *C. difficile*

	Diagnostic basé uniquement sur la recherche de toxines libres	Diagnostic basé uniquement sur la présence de souches toxinogènes	Diagnostic basé sur la présence de souches toxinogènes et de toxines libres	Total
Méthodes multiples	0,0 %	0,0 %	40,7 % (11/27)	15,7 % (11/70)
Une seule méthode	70,0 % (14/20)	26,1 % (6/23)	0,0 %	28,6 % (20/70)
Algorithme	25,0 % (5/20)	69,6 % (16/23)	59,3 % (16/27)	52,8 % (37/70)
Autre	5,0 % (1/20)	4,3 % (1/23)	0,0 %	2,9 % (2/70)
Total	28,6 % (20/70)	32,9 % (23/70)	38,6 % (27/70)	

Catégorisation des algorithmes de diagnostic des ICD

Données disponibles pour 2011 et 2014¹

	2011		2014	
Algorithme	n	%	n	%
Optimal	15	19%	37	46%
Sub optimal	8	10%	12	15%
Incomplet	58	72%	32	40%
Total	81	100%	81	100%

Van Nood *et al.* for the 'European *Clostridium difficile* Infection Surveillance' network (ECDIS-net) Eurosurveillance 2016

Les choses évoluent dans le bon sens ... semble-t-il !?

Présence des toxines libres mieux corrélée à la sévérité de la maladie?

Expérience canadienne

- Cohorte prospective au cours de laquelle les selles ont été testées en parallèle par PCR (*tcdB*), et un algorithme en 3 étapes (GDH et toxines A et B par EIA puis test de cytotoxicité des selles)

N = 85 pts

Complications	CDI Cases Detected by PCR, but Not by EIA/CCA (n = 29)	CDI Cases Detected by Both PCR and EIA/CCA (n = 56)	P Value ^a
30-d mortality (%)	1 (3)	10 (18)	.09
Colectomy (%)	0 (0)	1 (2)	1.00
Admission to ICU (%)	0 (0)	1 (2)	1.00
Readmission for CDI (%)	0 (0)	11 (20)	.01
Occurrence of ≥ 1 complication (%)	1 (3)	22 (39) ^b	<.001

Présence des toxines libres mieux corrélée à la sévérité de la maladie?

Expérience anglaise

Differences in outcome according to *Clostridium difficile* testing method: a prospective multicentre diagnostic validation study of *C difficile* infection

Timothy D Planché, Kerrie A Davies, Peter G Coen, John M Finney, Irene M Monahan, Kirsti A Morris, Lily O'Connor, Sarah J Oakley, Cassie F Pope, Mike W Whitt, Nandini P Shetty, Derrick W Crook, Mark H Wilcock

- Etude prospective multicentrique incluant 10,186 patients
- **La présence de toxine libre est significativement associée à une évolution défavorable**
- Les patients ayant seulement une souche toxigène ne diffèrent pas en termes de mortalité et d'hyperleucocytose de la population indemne d'ICD

CTA = test de cytotox des selles, TC = culture toxigénique,

	Group 1: CTA+ (n=435)	Group 2: TC+ CTA- (n=207)	Group 3: CTA- TC- (n=5,880)
Mortality	16.6%	9.7% (p=0.022 vs Gp. 1)	8.6% (p<0.001 vs Gp. 1; p=0.53 vs Gp. 2)
WBC count ($\times 10^9/L$)	12.4 $\pm$ 8.9	10.1 $\pm$ 5.8 (p<0.001 vs Gp. 1)	9.9 $\pm$ 10.7 (p<0.01 vs Gp. 1 P=0.69 vs Gr 2)
Mean LOS after sample (days)	19.4 $\pm$ 25	18.6 $\pm$ 27 (p=0.94 vs Gr1)	14.2 $\pm$ 22 (p<0.0001 vs Gr 1 P=0.002 vs Gr2)

Présence des toxines libres mieux corrélée à la sévérité de la maladie?

Expérience anglaise

Differences in outcome according to *Clostridium difficile* testing method: a prospective multicentre diagnostic validation study of *C difficile* infection

Timothy D Planche, Kerrie A Davies, Peter G Coen, John M Finney, Irene M Monahan, Kirsti A Morris, Lily O'Connor, Sarah J Oakley, Cassie F Pope, Mike W Whitt, Nandini P Shetty, Derrick W Crook, Mark H Wilcock

- Etude prospective multicentrique incluant 10,186 patients
- **La présence de toxine libre est significativement associée à une évolution défavorable**
- Les patients ayant seulement une souche toxigène ne diffèrent pas en termes de mortalité et d'hyperleucocytose de la population indemne d'ICD

CTA = test de cytotox des selles, TC = culture toxigénique,

	Group 1: CTA+ (n=435)	Group 2: TC+ CTA- (n=207)	Group 3: CTA- TC- (n=5,880)
Mortality	16.6%	9.7% (p=0.022 vs Gp. 1)	8.6% (p<0.001 vs Gp. 1; p=0.53 vs Gp. 2)
WBC count (× 10 ⁹ /L)	12.4 ± 8.9	10.1 ± 5.8 (p<0.001 vs Gp. 1)	9.9 ± 10.7 (p<0.01 vs Gp. 1 P=0.69 vs Gr 2)
Mean LOS after sample (days)	19.4 ± 25	18.6 ± 27 (p=0.94 vs Gr1)	14.2 ± 22 (p<0.0001 vs Gr 1 P=0.002 vs Gr2)

Présence des toxines libres mieux corrélée à la sévérité de la maladie?

Expérience US

- Etude prospective observationnelle monocentrique
- 1416 adultes testés vis-à-vis de *C. difficile* > 72 après l'admission
- Selles testées par **BM** (non rapporté) et par **EIA toxines** (rapporté au clinicien)

	PCR+/tox+ (n=131)	PCR+/tox- (n=162)	<i>C. difficile</i> négative (n=1123)	p
N selles J1 (médiane)	5 (3-6)	3 (2-5)	3 (2-5)	<0,001
Complications (%) ou décès dans les 30 j	18 (13,7%)	1 (0,6%)	3 (0,3%)	<0,001
Test CD refait entre 15 et 30 j	26 (19,8%)	18 (11,1%)	1076 (9,4%)	0,001
Test positif en toxines	14 (17%)	5 (3,1%)	10 (0,9%)	<0,001
Traitement dans les 14 j	131 (100%)	66 (40,7%)	361 (32,1%)	<0,001
Leucocytes > 15 000/μl	54/129 (41,9%)	50/154 (32,5%)	323/1101 (29,3%)	0.01
Lactoferrine fécale (médiane)	37,7 (8-261)	20,1 (5-50)	7,8 (05-32)	<0,001

Présence des toxines libres mieux corrélée à la sévérité de la maladie?

Expérience US

- Etude prospective observationnelle monocentrique
- 1416 adultes testés vis-à-vis de *C. difficile* > 72 après l'admission
- Selles testées par BM (non rapporté) et par EIA toxines (rapporté au clinicien)

	PCR+/tox+ (n=131)	PCR+/tox- (n=162)	<i>C. difficile</i> négative (n=1123)	p
N selles J1 (médiane)	5 (3-6)	3 (2-5)	3 (2-5)	<0,001
Complications (%) ou décès dans les 30 j	18 (13,7%)	1 (0,6%)	3 (0,3%)	<0,001
Test CD refait entre 15 et 30 j	26 (19,8%)	18 (11,1%)	1076 (9,4%)	0,001
Test positif en toxines	14 (17%)	5 (3,1%)	10 (0,9%)	<0,001
Traitement dans les 14 j	131 (100%)	66 (40,7%)	361 (32,1%)	<0,001
Leucocytes > 15 000/μl	54/129 (41,9%)	50/154 (32,5%)	323/1101 (29,3%)	0.01
Lactoferrine fécale (médiane)	37,7 (8-261)	20,1 (5-50)	7,8 (05-32)	<0,001

48/162 (29,6% positif par CTA) donc c'est une question de sensibilité pour une partie des selles

CTA: test de cytotoxicité des selles

Le CT de la PCR est prédictif de la sévérité ?

Etude :

De décembre 2013 à Avril 2014
1097 selles liquides

Résultats:

Les échantillons de patients ayant des infections sévères démontrent des CT pour la PCR plus bas que les autres patients (**26.5 +/- 4.8**, n=9 vs. **31.2 +/- 4.8**, n=45, p=0.02)

“To our knowledge this is the first study reporting a significant correlation between CT-values of the Xpert *C. difficile* test and severity of CDI.”

“Our finding is in line with the observations that severe course of CDI is associated with free toxin detection in stool specimen and that free toxin detection is associated with low PCR CT-values”

Le CT de la PCR est prédictif d'un mauvais pronostic vital ?

Etude :

De décembre 2014 à mai 2015

170 échantillons

Résultats:

Haut risque de complications ICD < 23.5 CT

Risque moyen de complications ICD : 23.5–27.9 CT

Faible risque de complications ICD : ≥ 28.0 CT

POCDI = Poor-outcome CDI

“Low toxin B Ct values from samples collected at the initial moment of diagnosis appears to be a strong marker for poor outcome. This available test may identify, at an early stage, patients who are at higher risk of a poor outcome CDI.”

Présence des toxines libres mieux corrélée à la sévérité de la maladie?

- Plusieurs autres études n'ont pas retrouvé de corrélation 1,2, mais...

Table 1. Baseline Characteristics and Outcomes of the 132 Patients With *Clostridium difficile* Diagnosed by Polymerase Chain Reaction for Toxin B Genes

Characteristic	Enzyme immunoassay positive (n = 90)	Enzyme immunoassay negative (n = 42)	P
Age, mean years (range)	68 (30–91)	63 (28–93)	.12
Male sex	89 (99)	40 (95)	.24
Unformed bowel movements, mean no./d (range)	5 (1–17)	5 (2–18)	.50
<3 Unformed bowel movements/d	7 (8)	4 (10)	.74
Clinical conditions			
Diabetes mellitus	36 (40)	16 (38)	.83
Chronic pulmonary disease	32 (36)	10 (24)	.18
End-stage renal disease	4 (4)	2 (5)	>.99
Cancer	18 (20)	5 (12)	.33
Neurological disease	22 (24)	11 (26)	.59
Paraplegia	14 (16)	3 (7)	.18
Heart disease	24 (27)	14 (33)	.43
Long-term care facility residence	27 (30)	11 (26)	.66
Antibiotic use in past 90 days	78 (87)	35 (83)	.61
Hospitalized >48 hours in past 90 days	40 (44)	26 (62)	.06
Limited mobility ^a	30 (33)	8 (19)	.09
Classification of CDI			
Community-onset ^b	10 (11)	9 (21)	.12
Community-associated ^c	7 (8)	6 (15)	.20
Severe, uncomplicated ^d	25 (28)	9 (21)	.53
Severe, complicated ^e	3 (3)	2 (5)	.24
CDI therapy			
Metronidazole	67 (74)	35 (83)	.37
Vancomycin	20 (22)	5 (12)	.23
Metronidazole and vancomycin	3 (3)	2 (5)	.24
Outcome			
Recurrence ^f	15 (17)	10 (24)	.33
Death due to any cause	1 (1)	2 (5)	.23
Death due to CDI	0 (0)	1 (2)	...

1 patient décédé d'une colite fulminante

1. Guerrero *et al* CID 2011
2. Rao *et al* CID 2015

Diagnostic moléculaire et DMS ?

Réduction DMS totale (jours)

-1366 € par patient

-1954 € par patient

Réduction DMS (jours) depuis collecte échantillon

-1209 € par patient

-1905 € par patient

Economies (€)
DMS totale

Economies (€)
DMS depuis échantillon

ICD positif

1366.7

1209.7

ICD négatif

1954.0

1905.5

Investir 35€ pour un test PCR rapide fournit:

- Résultat utile cliniquement en une 1hr
- Economies > **€1,000** par patient en réduisant la durée de séjour

Diagnostic des ICD : L'expérience Lyonnaise

ICD

Immunochromatographie
Techlab®
C. diff Quick check
Complete® Alere™

GDH+ / TOX+

diagnostic retenu

GDH - / TOX -

diagnostic exclu

GDH+ / TOX -

PCR
Xpert® C. difficile
GeneXpert® Cepheid®

Si - : diagnostic exclu

Si + : diagnostic ICD

Diagnostic des ICD : L'expérience Lyonnaise

Diagnostic des ICD : L'expérience Lyonnaise

Ristretto

Arpeggio

Roma

Decaffeinato
Intenso

Livanto

Capriccio

Volluto

Così

Decaffeinato

Diagnostic des ICD : L'expérience Lyonnaise

Diagnostic des ICD : L'expérience Lyonnaise

IMMUNOCHROMATOGRAPHIE

	GDH -		GDH +		TOTAL
	TOX -	TOX +	TOX -	TOX +	
PCR Tox -		2	227		
PCR Tox +		0	282		
Total	5008	2	509	277	5796

En grisé : cas d'ICD confirmés (n = 559)

La présence de CD toxinogènes a été mise en évidence dans 9,7% des cas (559/5796).

Dans 282 cas (50.45%), seule la PCR a permis le diagnostic.

Nbre de diagnostic d'ICD par PCR

≈

Nbre de diagnostic d'ICD par test immunologique

Diagnostic des ICD : L'expérience Lyonnaise

Actualités futures :

- Recommandations européennes à venir
(fin 2017 probablement)

Mais pas de révolution à attendre sur le diagnostic mais des algorithmes indispensables et opposables question qui paie le surcoût?

- Evaluation encore nécessaire sur Ct PCR
- Choix des techniques dépendants des structures de la boratoire
- Quid des approches syndromiques ?

Merci à Frédéric BARBUT pour nos échanges et le partage de certaines diapositives

Merci de votre attention