

1. A propos des infections sexuellement transmissibles (IST) en France, parmi les propositions suivantes laquelle (lesquelles) est (sont) juste(s) ?

- A l'incidence des principales IST est en augmentation constante depuis le début des années 2000
- B la syphilis est une IST à déclaration obligatoire
- C la gonococcie n'est pas une IST à déclaration obligatoire
- D le dépistage systématique de Chlamydia trachomatis est recommandé chez les jeunes femmes de moins de 25 ans consultant dans des lieux à vocation de dépistage
- E certaines IST favorisent la transmission du VIH

2. Concernant le gonocoque, parmi les propositions suivantes laquelle (lesquelles) est (sont) juste(s) ?

- A il s'agit d'un cocci à Gram négatif en diplocoques
- B il peut être responsable d'infections disséminées
- C le diagnostic microbiologique d'une infection à gonocoque avec réalisation d'un antibiogramme est recommandé
- D le traitement de 1ère intention est une antibiothérapie orale
- E le traitement repose sur une céphalosporine de 3ème génération

3. Concernant C. trachomatis, parmi les propositions suivantes laquelle (lesquelles) est (sont) juste(s) ?

- A. il s'agit d'une bactérie intracellulaire facultative
 - B. cette bactérie peut être cultivée sur une gélose
 - C. son diagnostic repose essentiellement sur la biologie moléculaire
 - D. C. trachomatis est responsable uniquement d'infections génitales basses
 - E. les antibiotiques les plus actifs sur cette bactérie appartiennent à la classe des macrolides et des cyclines
- A il s'agit d'une bactérie intracellulaire facultative
 - B cette bactérie peut être cultivée sur une gélose
 - C son diagnostic repose essentiellement sur la biologie moléculaire
 - D C. trachomatis est responsable uniquement d'infections génitales basses
 - E les antibiotiques les plus actifs sur cette bactérie appartiennent à la classe des macrolides et des cyclines



4. Concernant les urétrites, parmi les propositions suivantes laquelle (lesquelles) est (sont) correcte(s) ?

- A la co-infection gonocoque et *C. trachomatis* est classiquement rapportée mais avec un pourcentage très variable suivant les études
- B les uréaplasmes peuvent en être à l'origine
- C *Mycoplasma hominis* peut causer des urétrites masculines
- D *Trichomonas vaginalis* est une cause fréquente d'urétrite en Europe
- E certains *Haemophilus* peuvent être impliqués dans les urétrites



