

Pré test - Séminaire DES

Thématique 24 : médecine des voyages – médecine des migrants
Mardi 30/01/18

1. Le risque de paludisme pour un séjour sans prévention d'1 mois en Afrique de l'Ouest est de l'ordre de :

- a. 50 %
- b. 30 %
- c. 10 %
- d. 5 %
- e. 2 %

R : e

2. Même question pour un séjour en Asie du Sud Est

- a. 10 %
- b. 5 %
- c. 1 %
- d. 0,1 %
- e. 0,001 %

R : e

3. Chez un voyageur ayant des antécédents d'infarctus du myocarde et d'épilepsie et qui désire faire un séjour de 10 mois au Cameroun la chimioprophylaxie peut être réalisée par :

- a. Atovaquone-proguanil
- b. Méfloquine
- c. Doxycycline
- d. Chloroquine-proguanil
- e. Azithromycine

R : a,c

4. Le traitement de référence du paludisme grave est

- a. Quinine IV à la seringue électrique avec dose de charge
- b. Quinine IV en perfusion de 4 h avec dose de charge
- c. Artesunate IM
- d. Artesunate IV
- e. Artemether IM

R : d

5. Indiquez les antipaludiques de 1^{ère} ligne pour l'accès palustre simple à *P falciparum* de l'adulte

- a. Méfloquine
- b. Atovaquone-proguanil
- c. Dihydroartémisinine (artémisinol)-piperaquine
- d. Artemether-lumefantrine
- e. Quinine orale

R : c,d

6. Il est possible de réaliser le vaccin contre la fièvre jaune chez un enfant de 7 mois
OUI / NON

R : OUI

7. Le vaccin préventif contre la rage :
- Permet d'éviter la vaccination post-exposition en cas de morsure
 - Permet d'allonger la période d'incubation en cas de morsure par un chien enragé
 - Est indiqué chez les enfants de 1 à 4 ans si séjour à risque
 - Est un vaccin à virus vivant atténué
 - Est réservé aux centres anti-rabiques

R : b,c

8. Le traitement le plus adapté pendant le séjour d'une diarrhée liquidienne, afébrile, de +/-3 selles par jour chez un homme de 34 ans sans antécédent particulier est (une seule bonne réponse)

- Lopéramide + azithromycine
- hydratation + racecadotril
- hydratation + racecadotril + azithromycine
- racecadotril + azithromycine
- lopéramide + fluoroquinolone

R : b

9. chez un migrant primo-arrivant d'Afrique sub-Saharienne, les sérologies systématiques de dépistage suivantes sont souhaitables

- sérologie schistosomoses
- sérologie maladie de Chagas
- sérologie VIH
- sérologie HTLV1
- sérologie hépatite B et C

R : a,c,e

10. concernant la prise en charge des migrants (une ou plusieurs réponses)

- les aspects culturels sont un obstacle fréquent à une bonne observance
- l'interprétariat par un membre de la famille doit être privilégié
- l'AME est possible dès le 4^{ème} mois de présence en France
- les PASS sont réservées aux urgences vitales
- la rédaction des certificats descriptifs pour une demande de carte de séjour pour soin est réservée aux médecins agréés « préfecture »

R : c