

# DESC DE MALADIES INFECTIEUSES ET MEDECINE TROPICALE

31 janvier 2018 : Vaccinations

## Pré-test

1) **Quelle(s) différence(s) présente le vaccin anti-pneumococcique conjugué par rapport au non-conjugué ?**

- a) il permet une protection contre davantage de sérotypes
- b) il est plus immunogène chez l'immunodéprimé
- c) il est efficace sur le portage pharyngé
- d) il est associé à un risque d'hyporéactivité

Réponses : b, c, d

2) **Le vaccin varicelle :**

- a) peut être utilisé en post-exposition
- b) est un vaccin inactivé
- c) est un vaccin recommandé pour tous les enfants
- d) doit être réalisé chez les femmes en âge de procréer non immunes

Réponses : a, d

3) **Les patients sous immunosuppresseurs**

- a) doivent recevoir le vaccin anti-pneumococcique conjugué
- b) doivent recevoir le vaccin anti-HBV
- c) peuvent recevoir le vaccin anti-fièvre jaune si le traitement immunosuppresseur est suspendu pendant les 3 mois suivants
- d) doivent recevoir le vaccin anti-zona

Réponses : a, b, c

4) **La vaccination anti-rougeoleuse**

- a) est efficace à plus de 95% après 2 injections
- b) permet d'empêcher la circulation du virus si au moins 75% de la population est immune
- c) est recommandée systématiquement pour les sujets nés après 1980
- d) nécessite de réaliser une sérologie pré-vaccinale

Réponses : a, c

5) **Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes**

- a) Chez l'adulte infecté par le VIH, les vaccins vivants sont toujours contre-indiqués
- b) Certains vaccins sont spécifiquement recommandés chez les personnes vivant avec le VIH
- c) La mise à jour du calendrier vaccinal (administration des rappels) doit se faire le plus tôt possible au cours de la prise en charge d'un patient infecté par le VIH
- d) Pour certains vaccins, il est recommandé de vérifier les titres en anticorps induits par la vaccination
- e) Un taux de CD4 bas est le principal facteur de mauvaise réponse à la vaccination

Réponses : b, c, d

6) **Parmi les vaccins suivants, quel(s) est (sont) celui (ceux) qui est (sont) recommandé(s) chez toutes les personnes vivant avec le VIH?**

- a) Grippe saisonnière
- b) Hépatite B
- c) Hépatite A
- d) Méningocoque quadrivalent A,C,Y,W135
- e) Pneumocoque

Réponses : a, b, c, e

7) **Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles qui sont inexactes ? La vaccination contre les infections invasives à pneumocoque chez les personnes vivant avec le VIH**

- a) Est recommandée uniquement chez les patients ayant une co morbidité
- b) Repose sur le vaccin polysaccharique non conjugué
- c) Est réalisée uniquement avec le vaccin conjugué Prevenar13
- d) Doit être réalisée tous les 5 ans

Réponses : b

8) **Quelle(s) mesure(s) préventive(s) devez-vous envisager en cas de sérologie rougeole négative chez une femme enceinte qui a été exposée la veille à un patient présentant une rougeole ?**

- a) vaccination immédiate contre la rougeole
- b) administration d'immunoglobulines polyvalentes par voie intraveineuse
- c) administration d'amantadine en urgence
- d) surveillance simple et administration d'immunoglobulines par voie intra-veineuse en cas de fièvre

Réponses : b

9) **D'une façon générale, parmi les vaccins suivants commercialisés en France en 2018, quels sont ceux contre-indiqués ou déconseillés pendant la grossesse ?**

- a) vaccin injectable contre la grippe
- b) vaccin contre la rougeole
- c) vaccin contre varicelle
- d) vaccin contre fièvre jaune
- e) vaccin contre le pneumocoque

Réponses : b, c, d