

PRE-TEST – Réponses - Mercredi – Thématique 24

1. **Le risque de paludisme pour un séjour sans prévention d'1 mois en Afrique de l'Ouest est de l'ordre de :**
- 50 %
 - 30 %
 - 10 %
 - 5 %
 - 2 %

Réponse : e

2. **Même question pour un séjour en Asie du Sud Est :**
- 10 %
 - 5 %
 - 1 %
 - 0,1 %
 - 0,001 %

Réponse : e

3. **Chez un voyageur ayant des antécédents d'infarctus du myocarde et d'épilepsie et qui désire faire un séjour de 10 mois au Cameroun, la chimioprophylaxie peut être réalisée par :**
- Atovaquone-proguanil
 - Méfloquine
 - Doxycycline
 - Chloroquine-proguanil
 - Azithromycine

Réponses : a, c

4. **Le traitement de référence du paludisme grave est :**
- Quinine IV en perfusion continue avec dose de charge
 - Quinine IV en perfusion de 4 h avec dose de charge
 - Artésunate IM
 - Artésunate IV
 - Artémether IM

Réponse : d

5. **Indiquez les antipaludiques de 1ère ligne pour l'accès palustre simple à P. falciparum de l'adulte**
- Méfloquine
 - Atovaquone-proguanil
 - Dihydroartémisinine-Pipéraquline
 - Artémether-Luméfántrine
 - Quinine orale

Réponses : c, d

6. **Il est possible de réaliser le vaccin contre la fièvre jaune chez un enfant de 7 mois ?**

- a. oui
- b. Non

Réponse : a

7. La vaccination préventive contre la rage :

- a. Permet d'éviter la vaccination post-exposition en cas de morsure
- b. Permet d'allonger la période d'incubation en cas de morsure par un chien enragé
- c. Est indiquée chez les enfants de 1 à 4 ans si séjour à risque
- d. Est un vaccin à virus vivant atténué
- e. Est réservée aux centres anti-rabiques

Réponses : b, c

8. Le traitement le plus adapté pendant le séjour d'une diarrhée liquidienne, afébrile, de 3 selles par jour chez un homme de 34 ans sans antécédent particulier est : (une seule bonne réponse)

- a. Lopéramide + azithromycine
- b. hydratation + racecadotril
- c. hydratation + racecadotril + azithromycine
- d. racecadotril + azithromycine
- e. lopéramide + fluoroquinolone

Réponse : b

9. Chez un migrant primo-arrivant d'Afrique sub-Saharienne, les sérologies systématiques de dépistage suivantes sont souhaitables

- a. sérologie schistosomose
- b. sérologie maladie de Chagas
- c. sérologie VIH
- d. sérologie HTLV1
- e. sérologie hépatite B et C

Réponses : a, c, e

10. Citer les bonnes attitudes pédagogiques à adopter lors des consultations du voyage :

- a. Il est peu utile et très chronophage de questionner le voyageur sur ses connaissances des risques encourus et de leur prévention
- b. Insister sur la gravité des problèmes de santé en voyage quitte à faire peur est très efficace pour la mémorisation des conseils de prévention
- c. Pour vérifier la compréhension des messages il est recommandé en fin de consultation de demander au voyageur de reformuler les conseils donnés
- d. Délivrer 2 ou 3 messages de prévention est plus efficace que de donner une information complète sur les risques et leur prévention
- e. Chez les voyageurs « anti vax » il faut passer le temps qu'il faut pour les convaincre de faire les vaccinations que vous jugez nécessaires

Réponses : c, d