

Guyane

MIT fébriles	MIT non fébriles	Absence
Paludisme (<i>P. vivax</i> 80 %, <i>P. falciparum</i> 20 %) principalement zones d'orpaillage illégales en communes isolées.	Leishmaniose cutanée (muqueuse rare, viscérale exceptionnelle) <i>L. guyanensis</i> (80 %) > <i>L. braziliensis</i> > <i>L. amazonensis</i> > <i>L. lansoni</i>	Pas de bilharziose
Toxoplasmose amazonienne (pneumopathie interstitielle fébrile)	Pou d'agouti	Pas de cysticercose
Leptospirose	Myiase "Ver macaque" (<i>Dermatobia hominis</i>)	Pas de filariose
Fièvre Q (atteinte pulmonaire > 90 %, 1 ^{re} cause de pneumopathie)	Tungose "Puce chique" (<i>Tunga penetrans</i>)	Pas de Virus West Nile
Arbovirus : dengue ++, Mayaro, Tonate, fièvre jaune sporadique	Maladie de Chagas rare	
Syndrome pulmonaire à Hantavirus souche Maripa	Helminthose digestive (anguillulose, ankylostomose)	
VIH (incidence la plus élevée de France)	Lèpre	
HTLV1 (lymphome ATL ++)	Ulcère de Buruli	
Histoplasmose disséminée du PVVIH à <i>Histoplasma capsulatum</i> var. <i>capsulatum</i>	Diphthérie cutanée	
	Surinfections cutanées bactériennes	
	Rage des chiroptères (pas de rage canine mais importation d'animal à risque possible)	
	Lobomycose	