



ELSEVIER

Disponible en ligne sur

ScienceDirect

www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France


EM|consulte

www.em-consulte.com



FICHE PATIENT

Bon usage de la rifampicine 300 mg (RIFADINE®)



Antibiotique disponible en pharmacie de ville

1. Objectif et schéma thérapeutique

Votre médecin vous a prescrit ce médicament pour traiter une infection provoquée par une bactérie.

La posologie et la durée de traitement choisies par le médecin dépendent de la bactérie retrouvée et du site infecté.

Il est impératif de respecter cette posologie et la durée de traitement, au risque de s'exposer à une récidive de votre infection ou à l'apparition de bactéries résistantes qui compliqueraient votre prise en charge.

Une fois votre antibiothérapie terminée, il faudra rapporter à votre pharmacie vos comprimés non utilisés.

En aucun cas cet antibiotique ne doit être utilisé sans prescription.

2. Comment prendre votre traitement ?

- 2 ou 3 comprimés le matin, ou 2 comprimés matin et soir ;
- À 2 heures de distance des repas, de préférence.

Ne modifiez jamais la dose ou n'arrêtez pas votre traitement sans l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.
Ne pas ouvrir les gélules.

3. Que faire en cas d'oubli ?

En cas d'oubli d'une prise : prenez les comprimés oubliés dès que vous vous en rendez compte, sauf si c'est au moment de la prise suivante. **Surtout, ne jamais doubler la dose !**

4. Interactions médicamenteuses

La rifampicine interagit avec de nombreux autres médicaments (anticoagulants, pilules contraceptives, chimiothérapies, antirétroviraux, antiépileptiques, anxiolytiques, anti-hypertenseurs, etc.).

Les possibles interactions avec votre traitement habituel ont été prises en compte lors de l'initiation de ce traitement. Il est important de prévenir votre médecin de la prise de ce traitement pour toute nouvelle prescription.

Il ne faut pas prendre d'autres médicaments disponibles sans ordonnance (gélules à base de plantes, infusions, produits diététiques, produits proposés sur internet, etc.) sans prévenir votre médecin ou votre pharmacien.

5. Quelle est la surveillance et les effets indésirables possibles de votre traitement ?

Comme tout médicament, la rifampicine possède des effets indésirables :

- Ce médicament peut provoquer des nausées. Le prendre avec de la nourriture diminue ces nausées, mais aussi son absorption par le tube digestif. La décision de changer l'heure de la prise par rapport aux repas doit donc être réalisée en discussion avec votre médecin.

- La rifampicine colore toutes les sécrétions corporelles en rouge (urines, larmes, etc.). Pas d'inquiétude, ce n'est pas du sang !

- Ce médicament peut entraîner des troubles hépatiques. Pour surveiller le bon fonctionnement de votre foie, votre médecin peut donc vous prescrire une prise de sang régulière.

Si ces symptômes persistent, parlez-en à votre médecin.

<https://doi.org/10.1016/j.mmifmc.2025.02.002>

2772-7432/© 2025 Published by Elsevier Masson SAS on behalf of Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française (SPILF).