


Stratégie multidisciplinaire et *hors les murs* pour l'accès à la prophylaxie pre-exposition (PrEP) et la rétention dans le soin des femmes trans (FT) à risque élevé d'infection VIH

Valentina Isernia, Frezzia Peralta, Françoise Ouvrard, Minerva Cervantes, Marc Digumber, André Deprez, Sylvie Le Gac, Karen Champenois, Aurelie Sautereau, Antoine Bachelard, Bao Phung, Aïda Benalycherif, Roland Landman, Laszlo Blanquart, Jade Ghosn



Journées Thématiques Santé Sexuelle **2025**


○ IST ○ PrEP ○ Vaccination



INTRODUCTION

- Malgré les taux élevés de prévalence du VIH chez les femmes trans (FT), peu d'interventions préventives ont ciblé spécifiquement cette population
- Dans le but d'améliorer les programmes de dépistage, prévention et traitement du VIH et des IST parmi la population trans, une convention a été établie entre l'association Acceptess-T, accueillant des personnes trans, et le SMIT de l'hôpital Bichat à Paris, France :
 - ✓ 2018 : Mise en place des consultations PREP dédiées aux FT au CeGIDD
 - ✓ 2019 : Permanence PrEP *hors les murs*

Programme PrEP *hors les murs* : un exemple de co-construction intégrale des parcours de santé



Diapositive 3

1

Pole socio adminsitratif :

-première evaluation de la situation sociale et accompagnement pour les demarches administratives : permis de sejour, couverture sanitaire

FAST: si une situa

Pole juridique :

F

Pole de santé :


Evaluation du besoin en santé par les mediatrices, focus santé sexuelle

Realizacion des TROD VIH, VHC, Syphilis



orientacion vers la permanence santé sexuelle, PEC par un medecin hyspanophone qui evalue la primoprescription PrEP
Suivi en ville ou au SMIT

Pour le personnes VIH orienté à l Hopital

RESULTATS : file active FT sous PrEP à Bichat entre 2016-2023



Femme TG	N=209 n (%)
Couverture sociale	112 (53)
Travail sexuel	157 (74)
Traitement hormonal féminisant	80 (38)
Chirurgie réassignation sexuelle	15 (7)
Schéma PrEP	
En continu	197 (94)
À la demande	12 (6)
Effets secondaires (n=190)	
Bonne tolérance	177 (93)
Évènements indésirables (EI)	13 (7)
Arrêt PrEP pour EI	10 (6)
• Gastro-intestinales	7 (4)
• Toxicité rénale	1 (0,5)
Cas de séroconversion VIH	2 (1)



CONCLUSIONS

- Dans la file active de FT sous PREP le profil de tolérance a la PREP a été similaire à celui décrit pour des autres populations clefs.
- Un pourcentage élevé des FT qui ont présenté des effets secondaires ont arrêté la PREP (10/13, dont 2 séroconversion VIH) : importance +++ stratégies pour faciliter ETP (services multidisciplinaires, accompagnements par des paires, consultations dans la langue maternelle...)
- Notre programme multidisciplinaire PrEP montre un impact positif sur l'accès à la PrEP au sein de la cohorte de FT, même si le taux de rétention dans le soin reste faible.
- D'autres interventions sont actuellement en cours, pour analyser les obstacles à la PrEP et améliorer la rétention dans les soins pour cette population spécifique.