

Les comorbidités psychiatriques et addictologiques des usagers de CHEMSEX dans une consultation de psychiatrie-addictologie: COPACHEMS


Bao-Chau PHUNG ; Zélie JULIA ; Sibylle MAURIES ; Rodolphe BORAND ; Marie ROUVRAIS ; Bénédicte BARBOTIN ; Sylvie LE GAC ; David DUROY ; Michel LEJOYEUX ; Pierre Alexis GEOFFROY ; Jade GHOSN

Journées Thématiques Santé Sexuelle 2025

○ IST ○ PrEP ○ Vaccination



Contexte et méthodes



Cohorte COmorbidités
Psychiatriques et Addictologiques
des usagers de CHEMSEX

COPACHEMS

- Auto-questionnaires lors de la 1^{ère} consultation d'addictologie
- **Identifier les comorbidités psychiatriques et addictologiques des usagers de Chemsex**
- Caractériser les usagers
- Caractériser l'usage du Chemsex et les Co intoxications, les conséquences négatives sociales et médicales du Chemsex, l'addiction
- Délai avant une prise en charge spécialisée

Résultats (1)

Caractéristiques sociaux démographiques


- N= 51 tous HSH
- Age médian = 35 ans
- Emploi actif = 38 /51 (75%)
- Pas d'ATCD psychiatrique= 38/51 (75%)
- Infection par le VIH connu= 27/51 (53%)

Pratiques Chemsex

Produits consommés	Cathinones	49/51 (96%)
Nombre de produits consommés	> 5	14/51 (27%)
	3-4	23/51 (45%)
	<=2	14 (27.5 %)
Modification de la consommation pendant le confinement	augmentation	18/51 (35%)
	début de la consommation	10/51 (10%)
Pratique du slam	Oui	27/51 (52%)

Résultats (2)

Conséquences négatives et symptômes psychiatriques



Discussion

Cohorte COPACHEMS:

- Pratique du slam plus importante
- Population bien insérée
- Peu d'ATCD psychiatrique
- Score sévère d'addiction



Poursuivre une prise en charge spécialisée et multidisciplinaire

