Déterminants de la charge virale nasopharyngée chez les patients infectés par un virus grippal consultants en soins primaires: 2010-2018

R. Gueneau (1), S. Behillil (2), V. Enouf (2), S. Masse (3),
A. Vilcu (4), Y. Madec (1), S. Van der Werf (2)

- 1 Unité d'épidémiologie des maladies émergentes, Institut Pasteur, Paris, France,
- 2 Centre National de Référence des virus des infections respiratoires (dont la grippe), UMR 3569 CNRS, Université de Paris, Institut Pasteur, Paris, France
- 3 EA7310, Laboratoire de Virologie, Université de Corse-Inserm, Corte, France
- 4 Sorbonne Université, INSERM, Institut Pierre Louis d'Épidémiologie et de Santé Publique (IPLESP), Paris, France

Conflits d'intérêt

- Pas de conflit d'intérêt à déclarer

Surveillance

Données épidémiologiques saison 2017-2018 (BEH) :
 Estimation de 2,4 millions de cas de grippe en France
 Excès de mortalité estimé à 15 000 décès

- Estimer la morbi-mortalité imputable à la grippe
- Limiter le retentissement sur le système de soins
- Suivre l'adéquation des souches vaccinales

Sentinelles
 Réseau Sentinelles

grippenet.fr

réseau **RENAL**[®] : surveillance des cas graves en Réanimation

Réseau **OSCOUR**[®] : surveillance syndromique aux services d'urgence

Soins primaires : surveillance épidémiologique et virologique

Surveillance syndromique

Surveillance virologique

- Utilisation de la RT-PCR depuis 2009
- Rapide et performant pour caractérisation des types et sous-types viraux

Facteurs associés aux variations de charge virale

- Enfants++ et personnes âgées ; délai de consultation
- Possible différence entre patients hospitalisés et ambulatoires
- Association avec gravité non établie

Factors Associated With Real-Time RT-PCR Cycle Threshold Values Among Medically Attended Influenza Episodes

Sarah Spencer,^{1,2*} Jessie Chung,^{1,2} Mark Thompson,¹ Pedro A. Piedra,^{3,4} Alan Jewell,⁵ Vasanthi Avadhanulu,⁶ Minghua Mei,⁶ Michael L. Jackson,⁵ Jennifer Mecca,⁶ Maria Sundaram,⁶ Edward A. Belongia,⁶ Rachel Cross,⁷ Emileigh Johnson,⁷ Arlene Bullotta,⁸ Charles Rinaldo,⁸ Manjusha Gaglani,⁸ Kempapura Murthy,⁸ Lydia Clipper,⁸ LaShondra Berman,¹ and Brendan Flannery¹

Journal of Medical Virology 88:719-723 (2016)

Influenza and rhinovirus viral load and disease severity in upper respiratory tract infections

Andrea Granados^{4,5,*}, Adriana Peci⁴, Allison McGeer^{1,4,6}, Jonathan B. Gubbay^{4,5,6}

ORIGINAL ARTICLE

Influence of viral load in the outcome of hospitalized patients with influenza virus infection

Enio Lalueza^{1,2,3}, Dolores Folgueira^{2,3,4}, Irene Muñoz-Gallego⁴, Hernando Trujillo¹, Jaime Laureiro¹, Hernández-Jiménez¹, Noelia Moral-Jiménez⁴, Cristina Castillo¹, Blanca Ayuso¹, Carmen Díaz-Pedroche^{1,2}, María Torres¹, Estibaliz Arrieta¹, Coral Arévalo-Cañas¹, Olaya Madrid¹, Carlos Lumberas^{1,2,3,5}

Objectifs

- (i) Déterminer les **facteurs associés** aux variations de **niveau de charge virale** du **virus grippal** chez des patients consultants chez des **médecins généralistes** et **pédiatres** participants au réseau de surveillance en soins primaires.

- (ii) Déterminer l'association entre le **niveau de charge virale** et la « **gravité clinique** ».

Recrutement et recueil de données

Sentinelles
Réseau Sentinelles

Institut Pasteur

- Réseau de surveillance en soins primaires (Nord de la France)
- Saisons **2010-11** à **2017-18**
- Sélection des sujets
 - Premier de chaque semaine
 - Syndrome grippal et/ou infection respiratoire aigue

Pour chaque patient :

- ✓ Données sociodémographiques
- ✓ Terrain et antécédents
- ✓ Données cliniques et anamnestiques
- ✓ Issue de la consultation

**Écouvillon
nasopharyngé**

Identification du virus par RT-PCR

Estimation de la charge virale excrétée

Conversion à partir d'une
gamme de transcrits

Charge virale

Analyse des facteurs associés au niveau de charge virale

- Régression linéaire

Analyse des facteurs associés à la « gravité clinique »

- Régression logistique

Imputations multiples des données manquantes

Diagramme de flux

Description des saisons

	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	Total
Sous-type/lignage influenza									
N	766	531	944	365	805	1179	734	973	6297
A non typé	6 (0,8)	10 (1,9)	3 (0,3)	2(0,6)	2(0,3)	6(0,5)	7(1,0)	10(1,0)	46(0,7)
A(H1N1)pdm09	333 (43,5)	22 (4,1)	248 (26,3)	205(56,2)	148(18,4)	318(27,0)	7(1,0)	441(45,3)	1722(27,4)
A(H3N2)	81 (10,6)	472 (88,9)	216 (22,9)	150(41,1)	449(55,8)	9(0,8)	717(97,7)	90(9,3)	2184(34,7)
B	346 (45,2)	27 (5,1)	477 (50,5)	8(2,2)	206(25,6)	846(71,8)	3(0,4)	432(44,4)	2345(37,2)

Description des saisons

	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	Total
Sous-type/lignage influenza									
N	766	531	944	365	805	1179	734	973	6297
A non typé	6 (0,8)	10 (1,9)	3 (0,3)	2(0,6)	2(0,3)	6(0,5)	7(1,0)	10(1,0)	46(0,7)
A(H1N1)pdm09	333 (43,5)	22 (4,1)	248 (26,3)	205(56,2)	148(18,4)	318(27,0)	7(1,0)	441(45,3)	1722(27,4)
A(H3N2)	81 (10,6)	472 (88,9)	216 (22,9)	150(41,1)	449(55,8)	9(0,8)	717(97,7)	90(9,3)	2184(34,7)
B	346 (45,2)	27 (5,1)	477 (50,5)	8(2,2)	206(25,6)	846(71,8)	3(0,4)	432(44,4)	2345(37,2) ¹

Description des saisons

	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	Total
Sous-type/lignage influenza									
N	766	531	944	365	805	1179	734	973	6297
A non typé	6 (0,8)	10 (1,9)	3 (0,3)	2(0,6)	2(0,3)	6(0,5)	7(1,0)	10(1,0)	46(0,7)
A(H1N1)pdm09	333 (43,5)	22 (4,1)	248 (26,3)	205(56,2)	148(18,4)	318(27,0)	7(1,0)	441(45,3)	1722(27,4)
A(H3N2)	81 (10,6)	472 (88,9)	216 (22,9)	150(41,1)	449(55,8)	9(0,8)	717(97,7)	90(9,3)	2184(34,7)
B	346 (45,2)	27 (5,1)	477 (50,5)	8(2,2)	206(25,6)	846(71,8)	3(0,4)	432(44,4)	2345(37,2) ²

Description des sujets

N	6297
Sexe	
<i>Femme</i>	3192 (50,7)
<i>Homme</i>	3016 (47,9)
<i>Manquant</i>	89 (1,4)
Catégories d'âge	
<i>< 2 ans</i>	191 (3,0)
<i>2-4 ans</i>	859 (13,6)
<i>5-14 ans</i>	1658 (26,3)
<i>15-65 ans</i>	3156 (50,1)
<i>> 65 ans</i>	430 (6,8)
<i>Manquant</i>	3 (0,1)
Facteurs de risque	
<i>Non</i>	5057 (80,3)
<i>Oui</i>	699 (11,1)
<i>Manquant</i>	541 (8,6)
Statut vaccinal	
<i>Non</i>	5501 (87,4)
<i>Oui</i>	238 (3,8)
<i>Vacciné & âge>65 ans ou ID</i>	259 (4,1)
<i>Manquant</i>	299 (4,7)

- Sexe ratio à 1
- Age à l'inclusion:
 - 50% avec âge entre 15 et 65 ans
 - Faible proportion des >65 ans
- 10% des sujets avec ≥ 1 facteur de risque de complication
- 7% des sujets étaient vaccinés

Régression linéaire multivariée : effet de la saison

			3.668 (3.512 ; 3.826) log ₁₀ copies/μL	
Niveau moyen (IC 95%)				
saison				
2010	766 (12.2)		0.634 (0.492 ; 0.775)	
2011	531 (8.4)		0.365 (0.213 ; 0.516)	
2012	944 (15.0)		-0.183 (-0.314 ; -0.052)	
2013	365 (5.8)		0.323 (0.155 ; 0.490)	
2014	805 (12.8)		référence	
2015	1179 (18.7)		0.536 (0.403 ; 0.670)	
2016	734 (11.7)		0.488 (0.348 ; 0.628)	
2017	973 (15.5)		0.368 (0.234 ; 0.501)	

Régression linéaire multivariée : effet du type et du délai

Niveau moyen (IC 95%)
H1N1

3.668 (3.512 ; 3.826) log₁₀ copies/μL

			référence
Jour 1*	1014 (59.7)		
Jour 2	467 (27.5)		0.061 (-0.084 ; 0.206)
Jour 3	132 (7.8)		-0.393 (-0.633 ; -0.153)
Jour 4	51 (3.0)		-0.516 (-0.888 ; -0.143)
Jour 5	35 (2.0)		-0.787 (-1.234 ; -0.339)

H3N2

Jour 1	1281 (59.5)		0.452 (0.320 ; 0.586)
Jour 2	608 (28.2)		0.283 (0.130 ; 0.436)
Jour 3	178 (8.3)		-0.328 (-0.552 ; -0.104)
Jour 4	47 (2.2)		-0.372 (-0.773 ; -0.028)
Jour 5	38 (1.8)		-0.541 (-0.975 ; -0.106)

B

Jour 1	1138 (48.9)		0.755 (0.640 ; 0.870)
Jour 2	738 (31.7)		0.932 (0.803 ; 1.061)
Jour 3	290 (12.5)		0.690 (0.515 ; 0.865)
Jour 4	118 (5.1)		0.397 (0.143 ; 0.651)
Jour 5	42 (1.8)		0.181 (-0.229 ; 0.592)

Régression linéaire multivariée : autres variables

Niveau moyen (IC 95%)*		3.668 (3.512 ; 3.826) log ₁₀ copies/μL		
Age				
	<i>< 2ans</i>	190 (3.0)	0.515 (0.320 ; 0.710)	<0.001
	<i>2-4ans</i>	859 (13.6)	0.400 (0.298 ; 0.501)	
	<i>5-14ans</i>	1658 (26.3)	0.368 (0.287 ; 0.449)	
	<i>15-65ans*</i>	3156 (50.1)	référence	
	<i>>65ans</i>	430 (6.8)	0.210 (0.018 ; 0.402)	
	Données manquantes	3 (0.1)		
Sexe				
	<i>Féminin*</i>	3016 (47.9)	référence	0.011
	<i>Masculin</i>	3192 (50.7)	0.085 (0.019 ; 0.151)	
	Données manquantes	89 (1.4)		
Statut vaccinal				
	<i>non*</i>	5501 (87.4)	référence	0.039
	<i>vacciné</i>	238 (3.8)	0.142 (-0.032 ; 0.315)	
	<i>Vacciné & age ≥ 65 ans ou ID</i>	259 (4.1)	0.245 (0.005 ; 0.484)	
	<i>Données manquantes</i>	299 (4.7)		
Rhinite				
	Non	1382 (21.9)	référence	<0.001
	Oui	4110 (65.3)	0.301 (0.218 ; 0.384)	

Gravité

Définition

- dyspnée (n=520 ; 8,3%)
- hospitalisation (n=29 ; 0,5%)

*autres variables d'ajustement
Saison, céphalées, toux, conjonctivite

variable	grave (%)	OR (IC 95%)	significativité
Type			
<i>H1P</i>	152 (8,8)	1	
<i>H3</i>	218 (10,0)	1,21 (0,90 ; 1,62)	p=0,15
<i>B</i>	166 (7,1)	0,90 (0,70 ; 1,15)	
RT-PCR			
<i>Charge virale intermédiaire</i>	428 (8,5)	1	
<i>CV haute</i>	43 (6,9)	1,40 (1,04 ; 1,86)	p=0,005
<i>CV basse</i>	70 (11,1)	0,69 (0,49 ; 0,97)	
Délai symptômes prélèvements			
≤1	257 (7,4)	1	
2	175 (9,6)	1,12 (0,91 ; 1,39)	p=0,018
3	57 (9,4)	1,10 (0,80 ; 1,52)	
4	30 (13,8)	2,08 (1,34 ; 3,22)	
≥5	13 (11,1)	1,54 (0,82 ; 2,89)	
Age			
<2 ans	13 (6,8)	0,68 (0,37 ; 1,27)	p<0,001
2-4 ans	27 (3,1)	0,27 (0,18 ; 0,41)	
5-14 ans	56 (3,4)	0,27 (0,20 ; 0,36)	
15-65 ans	368 (11,7)	1	
>65 ans	76 (17,7)	1,14 (0,84 ; 1,56)	
Facteur de risque			
<i>non</i>	353 (7,0)	1	
<i>oui</i>	141 (20,2)	1,77 (1,32 ; 2,39)	p<0,001
Maladie respiratoire			
<i>non</i>	415 (7,8)	1	

Evolution de la charge virale

- Plus grande étude à ce jour analysant les variations de charge virale
 - Nombre de sujets
 - Saisons incluses (n=8)
- Constat : plus faible charge virale les saisons avec co-circulation des 3 virus
- Hypothèses
 - Co-circulation témoigne de l'absence de virus capable de prendre l'ascendant sur les autres virus ?

Evolution de la charge virale

- Âge : Plus forte charge virale aux âges extrêmes
- Rhinite : Seul symptôme associé au niveau de charge virale
 - Artefact lié à la méthode de prélèvement ?
 - Authentique lien avec une plus forte excrétion virale ?
- Différence entre les sexes :
 - Réponse immunitaire plus forte chez la femme (Exception: grossesse)
 - Différence de recours au système de soins ? (biais de sélection)
- Charge virale plus élevée chez les personnes âgées et les immunodéprimés vaccinés :
 - marqueur de fragilité et d'immunodépression/ sénescence
 - Moindre ou absence d'efficacité dans ces populations

Gravité

- Pas d'impact du type de virus sur la gravité
- Association du niveau de charge virale avec risque de gravité (Données hétérogènes dans la littérature)
- Âge : Pas de surrisque chez les personnes >65 ans (biais de recrutement ?)

Limites

- Données de surveillance: Applicable uniquement aux patients de soins primaires
- Reproductibilité de la méthode de prélèvement : écouvillon nasopharyngé opérateur dépendant ?
- RT-PCR:
 - Analyse semi-quantitative : gammes étalons faites à postériori
 - Pas de normalisation de la charge virale sur le gène de la NADPH-oxydase

Gravité

- Population de soins primaire : peut on parler de gravité ?
 - Plutôt marqueur de « risque de mauvaise évolution »
- Critère composite : Dyspnée (subjectif)
- Est-ce la bonne population pour étudier le lien entre Ct et gravité ?
 - compléter avec une population de «grippes sévères » (surveillance en soins intensifs)

Conclusion

- Fluctuation saisonnière des niveaux de charge virale
 - Non expliqué à ce jour
- Groupes avec charges virales hautes :
 - Âges extrêmes
 - Rhinite
 - Lien avec une plus forte contagiosité plausible mais non établis
 - Mesures spécifiques/ajustées concernant ces groupes
 - Vaccination des enfants

Merci pour votre attention !