COVID-19

Perspectives vaccinales

Pr Odile Launay

Déclaration d'intérêts de 2014 à 2019

- Intérêts financiers : non
- Liens durables ou permanents : non
- Interventions ponctuelles : Sanofi Pasteur, Pfizer, Janssen, GSK bio, MSD
- Intérêts indirects : Fonds de recherche : Sanofi Pasteur, Pfizer, GSK bio, Janssen, MSD

Vaccin COVID- 19: un développement accéléré

- 31 décembre 2019: déclaration à l'OMS de la survenue d'une épidémie de pneumonies d'allure virale d'étiologie inconnue
- 9 janvier 2020, autorités sanitaires chinoises et OMS annoncent la découverte d'un nouveau coronavirus, appelé 2019-nCoV (isolé le 7 janvier)

- **11-12 janvier 2020: séquence complète du génome du coronavirus transmise par les autorités chinoises**

- 16 mars 2020: démarrage du **1^{er} essai clinique** (Moderna, vaccin ARNm)
- 8 avril 2020 : 115 candidats vaccins dont 5 en développement clinique
- **Juillet 2020: début des essais de phase 3**

- 7 septembre 2020

- 8 candidats vaccins en phase 3
- Premiers résultats d'efficacité attendus avant la fin 2020

Les 4 grandes étapes du développement vaccinal

Les différentes phases cliniques de développement vaccinal

Phase I	Phase II	Phase III	Phase IV
Tolérance Immunogénicité	Immunogénicité Tolérance +/- challenge	Efficacité Sécurité	Pharmaco- épidémiologie
1ere administration chez l' homme	Définition de dose et du calendrier	Études « pivot » pour le dossier d' enregistrement	Etudes Post-AMM
N = dizaines	N = centaines	N = milliers	N > 10 000

Un délai de développement exceptionnellement court à la « vitesse de l'éclair »!

- **Situation inédite:** 6 mois entre la déclaration de l'épidémie et la mise en place des essais de phase 3!
- Rendue possible par :
 - les progrès scientifiques en immunologie et virologie, ayant permis par exemple le séquençage du coronavirus dès janvier
 - l'existence de technologies développées antérieurement pour d'autres vaccins (plateformes vaccinales) en particulier en préparation d'une maladie infectieuse émergente qui ont pu être adaptées aux vaccins Covid-19
 - à l'exceptionnelle mobilisation des équipes de recherche et des états pour le financement
 - à la mobilisation de volontaires pour réaliser les essais cliniques rapidement
 - à l'anticipation des industriels et des Etats pour le développement industriel de la production

Coalition for Epidemic
Preparedness Innovation

Technologies vaccinales des vaccins COVID 19

- technologies vaccinales classiques : virus inactivé, vaccins sous unitaire
- nouvelles technologies ou “plateformes vaccinales”:
 - Vecteurs viraux: replicatifs ou non replicatifs,**
 - Acides nucléiques: ADN, ARNm**
 - VLP : Virus Like Particules
 - Peptides synthétiques

Vecteurs viraux

- Développement depuis les années 1980
- Utilisations de virus ADN ou ARN non pathogènes pour l'homme pour induire une réponse immunitaire contre le pathogène d'intérêt
- Insertion du ou des gènes d'intérêt dans le génome du vecteur
- Expression de l'antigène dans le cadre d'une infection virale hétérologue permettant une forte stimulation de l'immunité innée nécessaire à l'induction d'une réponse immunitaire humorale et cellulaire (adjuvant intrinsèque)
- Intérêt de ces vecteurs viraux dans le cadre des MIE: caractéristiques (réponse immune, sécurité d'utilisation et fabrication) déterminées par le vecteur lui même
- Permet la construction rapide de nouveaux candidats vaccins

Vecteurs viraux

1. Vecteurs viraux répliatifs

- **VSV: virus de la stomatite vésiculeuse** (fièvre aphteuse), famille des *Rhabdoviridae* : vaccin Ebola
- **Souches vaccinales chimères**
- virus vaccinal fièvre jaune: Dengue, Encéphalite japonaise, West Nile,
- virus vaccinal rougeole : Chik, Zika, Lassa, SARS-CoV2

2. Vecteurs viraux non répliatifs

- **adénovirus**: humains (Ad5, Ad36, Ad 75), non humains ChAd63
- **poxvirus**:
 - irus de la vaccine: MVA, NYVAC
 - canarypox: ALVAC

Vaccins acides nucléiques

- Développements nombreux (Zika, Chik, influenza) mais pas de vaccins ayant une AMM
- Développement et mise au point rapide
- Facilité de production
- Vaccin ADN: nécessité d'administration par électroporation pour augmenter l'entrée dans la cellule et l'immunogénicité
- Vaccins ARNm, 2 types
 - ARNm non replicatif
 - ARNm « Self-amplifying »Entrée dans la cellule améliorée par encapsulation dans des nanoparticules lipidiques

Etat de lieux au 7 septembre 2020

Virus (inactivé, atténué)

Vecteur viral (réplicatif, non réplicatif)

Acide nucléique (ADN, ARN)

Protéines recombinantes

https://vac-lshtm.shinyapps.io/ncov_vaccine_landscape/

Dates possibles de disponibilité des vaccins pour une utilisation en condition "d'urgence"

Vaccin COVID-19: acceptabilité en France

A future vaccination campaign against COVID-19 at risk of vaccine hesitancy and politicisation

Vaccin COVID-19: acceptabilité en France

- Données poolées
- 8 036 répondants,
- 27,5% refus:
 - 29,2% 18-64 ans
 - 12,4% 65 ans et plus

Vaccin COVID-19: acceptabilité aux USA

- Etude internet conduite aux USA en Mai 2020
- 2006 adultes
- 69% d'acceptabilité du vaccin COVID19
- Facteurs associés à la vaccination:
 - recommandation par un professionnel de sante: RR=1,73, 95% CI: 1,49-2,02
 - orientation politique modérés RR=1,09, 95% CI: 1,02-1,16
 - ou liberaux RR=1,14, 95% CI: 1,07-1,22

Acceptability of a COVID-19 vaccine among adults in the United States: How many people would get vaccinated?

Paul L. Reiter^{*}, Michael L. Pennell, Mira L. Katz

College of Public Health, The Ohio State University, Columbus, OH, United States

Recherche vaccinale COVID 19 en France

- TASK FORCE vaccins/cellule interministérielle MESS/MESRI: mise en place d'un comité scientifique vaccins et financement d'une plateforme d'investigation clinique COVIREIVAC
- GUICHET UNIQUE pour les essais vaccins Covid-19
 - Essais industriels de vaccins en développement
 - Essais académiques
- Capacité à développer des essais à grande échelle en France (phases 2, 2b, 3)

COVIReivac : 4 axes

1. Mise en place d'un « pool » de participants potentiels avec:

- une communication adaptée,
- système d'information / participants potentiels (RGPD) : donnée personnelles, données de santé

2. Plateforme d'investigation clinique

- réseau des CICs/CRCs/CRBs
 - enseignants de médecine générale (CNGE)
- + Réseau de laboratoires d'immunomonitoring

3. Suivi des potentiels effets secondaires de ces candidats vaccins

4. Etudes d'acceptabilité des essais vaccinaux et de la vaccination

- Projet sur deux ans

- Financement MSS, MESRI

- Projet Reacting /FCRIN (I REIVAC + coordination) ; portage Inserm

- Dimensionnée pour 2-3 essais phase 3, 4-5 essais phase 2

- A partir du réseau F CRIN I REIVAC (24 centres cliniques hospitaliers répartis sur le territoire français dont 13 CICs)

- Calendrier

Essais phase 2b/3 : octobre 2020

Sites cliniques COVIREIRAC

● Sites I-REIVAC

● Nouveaux sites

Vaccination COVID -19 : populations prioritaires

9 juillet 2020, 16h30

VACCINS CONTRE LE SARS-CoV-2

9 JUILLET 2020

UNE STRATEGIE DE VACCINATION

CARE – Comité scientifique COVID-19 – Comité Vaccin COVID-19

HAS

Médicament ▾

Dispositif ▾

Moyens d'information ▾

Évaluation médico-économique ▾

Agenda

Industriels > Médicament > Vaccination > Stratégie de vaccination contre le COVID 19 - Anticipation des scénarios possibles de vaccination et recommandations préliminaires sur les populations cibles

Date de validation : 23 juillet 2020

Documents : 2

TÉLÉCHARGER LA RECOMMANDATION

ÉCOUTER

Stratégie de vaccination contre le COVID 19
- Anticipation des scénarios possibles de
vaccination et recommandations
préliminaires sur les populations cibles

RECOMMANDATION VACCINALE - Mis en ligne le 28 juil. 2020

COVID 19 perspectives vaccinales

- La mise au point d'un vaccin COVID-19 constitue un enjeu majeur sanitaire, économique et politique
- Les premiers résultats d'efficacité sont attendus avant la fin de l'année pour les premiers candidats vaccins et possiblement une mise a disposition au 1er trimestre 2021
- Les autorités réglementaires auront la responsabilité d'évaluer au mieux les bénéfices et les risques potentiels de ces nouveaux vaccins
- Une communication à visée des professionnels de santé et du grand public est indispensable pour assurer l'adhésion à la vaccination