





Etude de la prévalence de l'infection à VIH et des hépatites virales B et C, et chez les migrants réguliers en France : données de l'étude STRADA (2017-2020)

Martin Duracinsky; Issifou Yaya; Lisa Yombo-Kokule; Frédérique Thonon; Olivia Rousset-Torrente; Françoise Roudot-Thoraval; France Lert; David Zucman; Olivier Chassany.

Déclaration de liens d'intérêt avec les industries de santé en rapport avec le thème de la présentation (loi du 04/03/2002) :

-  Consultant ou membre d'un conseil scientifique OUI NON
-  Conférencier ou auteur/rédacteur rémunéré d'articles ou documents OUI NON
-  Prise en charge de frais de voyage, d'hébergement ou d'inscription à des congrès ou autres manifestations OUI NON
-  Investigateur principal d'une recherche ou d'une étude clinique OUI NON

Méthodes

- **STRADA est une étude observationnelle multicentrique, réalisée entre janvier 2017 et mars 2020 dans 21 centres de l'OFII en France**
- **Les participants éligibles étaient (1) des migrant(e)s, (2) âgé(e)s de 18 ans ou plus, (3) informé sur l'absence de lien entre le dépistage et la délivrance de titre de séjour et (4) ayant consenti à participer à cette étude.**
- **ATCD médico-personnels, données cliniques, sociodémographiques et comportementales**
21 133 questionnaires complétés
- **Réalisation de TROD (VIH, VHB et VHC)**
- **Régression logistique multivariante → identifier les facteurs associés à l'infection par le VIH, le VHB et le VHC**

Résultats TRODs réalisés chez 19 207 participants ☺

	N	Test positif	Prevalence % [IC à 95%]
VIH	15100	48	0,32 [0,23 – 0,42]
VHB (hommes)	5509	163	2,96 [2,53 – 3,44]
VHB (femmes)	9341	130	1,39 [1,16 – 1,65]
VHC	15216	41	0,27 [0,19 – 0,37]

Facteurs associés à un test VHB positif (hommes)

- Être originaire d'un pays de forte ou moyenne prévalence,
- Avoir un antécédent de pathologie hépatique,
- Avoir un antécédent de soins dentaires,
- Avoir été vacciné contre le VHB

Facteurs associés à un test VHB positif (femmes)

- Être originaire d'un pays de forte ou moyenne prévalence,
- Avoir un antécédent de pathologies hépatiques,
- Avoir cohabité avec une personne souffrant d'une hépatite B
- Avoir été vacciné contre le VHB

Facteurs associés à un test VIH positif

- Être originaire de pays de forte prévalence du VIH
- Avoir un antécédent de transfusion sanguine
- Être homosexuels ou bisexuels

Facteurs associés à un test VHC positif

- Être originaire de pays de forte prévalence du VHC
- Avoir un antécédent de transfusion sanguine
- Femmes avec un antécédent de césarienne ou d'avortement

Merci de votre attention

Financement

