

Témoignage de patients bénéficiants du traitement ARV intra-musculaire

Lisa Barrandon et Stéphanie Huon

Déclaration de liens d'intérêt avec les industries de santé en rapport avec le thème de la présentation (loi du 04/03/2002) :

Intervenant : Lisa Barrandon

Titre : Témoignage de patients Bénéficiant du traitement ARV
intra-musculaire

- | | | | | |
|--|--------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
|  Consultant ou membre d'un conseil scientifique | <input type="checkbox"/> | OUI | <input checked="" type="checkbox"/> | NON |
|  Conférencier ou auteur/rédacteur rémunéré d'articles ou documents | <input type="checkbox"/> | OUI | <input checked="" type="checkbox"/> | NON |
|  Prise en charge de frais de voyage, d'hébergement ou d'inscription à des congrès ou autres manifestations | <input type="checkbox"/> | OUI | <input checked="" type="checkbox"/> | NON |
|  Investigateur principal d'une recherche ou d'une étude clinique | <input type="checkbox"/> | OUI | <input checked="" type="checkbox"/> | NON |

Déclaration de liens d'intérêt avec les industries de santé en rapport avec le thème de la présentation (loi du 04/03/2002) :


Intervenant : Stéphanie Huon

Titre : Témoignage de patients Bénéficiant du traitement ARV
intra-musculaire

- | | | | | |
|--|--------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
|  Consultant ou membre d'un conseil scientifique | <input type="checkbox"/> | OUI | <input checked="" type="checkbox"/> | NON |
|  Conférencier ou auteur/rédacteur rémunéré d'articles ou documents | <input type="checkbox"/> | OUI | <input checked="" type="checkbox"/> | NON |
|  Prise en charge de frais de voyage, d'hébergement ou d'inscription à des congrès ou autres manifestations | <input type="checkbox"/> | OUI | <input checked="" type="checkbox"/> | NON |
|  Investigateur principal d'une recherche ou d'une étude clinique | <input type="checkbox"/> | OUI | <input checked="" type="checkbox"/> | NON |


Depuis le 21 décembre 2021, une nouvelle combinaison de deux antirétroviraux (rilpivirine et cabotégravir), injectables tous les deux mois, est commercialisée pour le traitement de l'infection par le VIH, après avoir obtenu son autorisation européenne de mise sur le marché en décembre 2020

Initiation du traitement à l'hôpital avant le passage en ville



Modalités d'injection :

- L'injection peut être réalisée en ventro-glutéal ou en intra-musculaire classique (quadrant supéro-externe de la fesse) avec la technique d'injection en Z
Attention si le tissu sous cutané parait trop épais utilisé une IM longue 5 cm afin de bien injecter dans le muscle.
- Agiter 10 secondes le flacon avant de remplir la seringue
- Chaque produit est injecté dans une fesse différente
- Vérifier l'absence de prise d'anticoagulant depuis la dernière injection



- L'injection doit être faite +/- 7 jours avant ou après la date théorique de 4 semaines pour la seconde injection et 8 semaines pour les suivantes.
- A noté : la rilpivirine injectable se conserve au froid entre 2°C et 8°C (à sortir 15 min avant l'injection) et le cabotégravir se conserve à température ambiante.

Conseils pour réussir mon relais injectable :

- L'injection peut être réalisée en ventro glutéal ou classiquement en intra-musculaire (quadrant supéro-externe de la fesse)
- Si l'IDE opte pour l'injection en ventro-glutéal, une vidéo de démonstration est proposée grâce à ce QR code :



- Je respecte le calendrier d'injection et j'anticipe mes déplacements.
- En cas d'empêchement je préviens rapidement le service ou l'IDE qui devait réaliser l'injection.

L'injection doit être faite +/- 7 jours avant ou après la date prévue.
En cas d'impossibilité d'injection dans ce délai, un relais par comprimés devra être pris jusqu'à reprogrammation d'une nouvelle injection.

- Après l'injection pour éviter une réaction locale :
 - Je reste actif,
 - J'évite de rester assis(e) longtemps,
 - J'évite les activités physiques intenses,
 - Je ne masse pas le site d'injection.
- J'avertis mon médecin référent :
 - En cas d'effet indésirable,
 - En cas de retard d'injection,
 - En cas de changement dans mes autres médicaments, pour éviter le risque d'interactions médicamenteuses.



Carnet de suivi des Injections intramusculaires à libération prolongée

Vocabria 600 mg (Cabotégravir)
Et
Rekombys 900 mg (Rilpivirine)

Nom : Prénom : Date de naissance : Médecin référent :
 Secrétariat Infectiologie : 04 50 63 66 02  Infirmières de consultations : 04 50 63 68 07 ou 04 50 63 70 09  Rétrocession pharmacie : 04 50 63 60 92
 Tel Infirmière libérale :  Tel de ma pharmacie de ville :

Injection N°	Date prévue	Date d'injection	Molécule	Fesse D/G	N° de Lot	Signature IDE	Commentaires
1			VOCABRIA (Cabotegravir) 600 mg				
			REKAMBYS (Rilpivirine) 900 mg				
2			VOCABRIA (Cabotegravir) 600 mg				
			REKAMBYS (Rilpivirine) 900 mg				
3			VOCABRIA (Cabotegravir) 600 mg				
			REKAMBYS (Rilpivirine) 900 mg				
4			VOCABRIA (Cabotegravir) 600 mg				
			REKAMBYS (Rilpivirine) 900 mg				
5			VOCABRIA (Cabotegravir) 600 mg				
			REKAMBYS (Rilpivirine) 900 mg				
6			VOCABRIA (Cabotegravir) 600 mg				
			REKAMBYS (Rilpivirine) 900 mg				
7			VOCABRIA (Cabotegravir) 600 mg				
			REKAMBYS (Rilpivirine) 900 mg				
8			VOCABRIA (Cabotegravir) 600 mg				
			REKAMBYS (Rilpivirine) 900 mg				
9			VOCABRIA (Cabotegravir) 600 mg				
			REKAMBYS (Rilpivirine) 900 mg				
10			VOCABRIA (Cabotegravir) 600 mg				
			REKAMBYS (Rilpivirine) 900 mg				
11			VOCABRIA (Cabotegravir) 600 mg				
			REKAMBYS (Rilpivirine) 900 mg				
12			VOCABRIA (Cabotegravir) 600 mg				
			REKAMBYS (Rilpivirine) 900 mg				

En 2022 au CHANGE (Centre Hospitalier Annecy Genevois)

- La 1ère injection d'ARV a eu lieu le 20/01/2022 (à St-Julien en Genevois) 15 jours après l'AMM
- La file active PVVIH était de 807 patients dont :
 - 557 hommes
 - 249 femmes
 - 1 personne trans
- 111 patients sous ARV injectable, soit 14% de la File active totale dont 83 hommes et 28 femmes.
- 9 patients ont arrêté (7 pour des douleurs aux points d'injection, 1 pour des nausées / fièvre / courbatures et 1 pour une grande fatigue et des idées noires.) soit 8%.

Espoir

Pratique

Liberté

Efficacité

Légèreté

Merci pour votre écoute

Avez-vous des questions ?