Transplantation de microbiote fécal : la détection de *Dientamoeba fragilis* doit-elle exclure les donneurs ? Une étude de cohorte longitudinale

Dr Keyvan Moser

Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), Lausanne (Suisse)

12.06.2025

Déclaration de liens d'intérêt avec les industriels de santé
en rapport avec le thème de la présentation (loi du 04/03/2002) :

L'orateur ne
souhaite
pas répondre

- **Intervenant** : Moser, Keyvan
- **Titre** : Transplantation de microbiote fécal : la détection de *Dientamoeba fragilis* doit-elle exclure les donneurs ? Une étude de cohorte longitudinale

- Consultant ou membre d'un conseil scientifique
- Conférencier ou auteur/rédacteur rémunéré d'articles ou documents
- Prise en charge de frais de voyage, d'hébergement ou d'inscription à des congrès ou autres manifestations
- Investigateur principal d'une recherche ou d'une étude clinique

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Contexte – Transplantation de microbiote fécal (TMF)

- ❖ Transfert de flore: donneur sain à receveur → **modulation**
- ❖ Infections à *C. difficile* récidivantes: **guérison > 85 %**
- ❖ Sélection des donneurs très rigoureuse (3-10% éligibles)
- ❖ Recherche sur la sécurité essentielle → *D. fragilis* ? (selon ANSM 2025¹)

Contexte – *Dientamoeba fragilis*

- ❖ Protozoaire intestinal
- ❖ Prévalence variable. Voie de transmission?
- ❖ Rôle pathogène controversé²
- ❖ Souvent détecté chez sujets asymptomatiques³
- ❖ TMF: exclure les donneurs positifs ?

Patients et méthode

- ❖ Étude de cohorte longitudinale CHUV, Lausanne (2023-2024)
- ❖ Donneurs et receveurs inclus prospectivement

- ❖ Analyse RT-PCR sur selles à 3 temps (rétrospective)
- ❖ Évaluation **efficacité** et effets indésirables (**sécurité**)

Résultats (1)

Résultats (2) - Receveurs

- ❖ 47 receveurs au total
- ❖ 23/47 avec TMF *D. fragilis*+
- ❖ 22/23 initialement négatifs
- ❖ 4/22 avec nouvelle détection post-TMF (18 %)

Table 2: Demographic characteristics of fecal microbiota transplantation recipients and comparison between transfer of *D. fragilis*-positive and -negative donor stool

Characteristics	<i>D. fragilis</i> -negative donor stool ^a	<i>D. fragilis</i> -positive donor stool ^a	p-value ^b
Age	73 (44, 79)	57 (52, 71)	0.2
Sex			>0.9
Male	73% (22/30)	74% (17/23)	
Female	27% (8/30)	26% (6/23)	
Severe CDI	50% (15/30)	48% (11/23)	0.9
Immunosuppression	27% (8/30)	43% (10/23)	0.2
Severe immunosuppression	6.7% (2/30)	8.7% (2/23)	>0.9
Route of FMT administration			0.05
Capsules	70% (21/30)	43% (10/23)	
Colonoscopy	30% (9/30)	48% (11/23)	
Jejunostomy	0% (0/30)	8.7% (2/23)	
FMT efficacy			0.12
Cured	87% (26/30)	100% (23/23)	
Recurrence	13% (4/30)	0% (0/23)	

Abbreviations: CDI, *Clostridioides difficile* infection; FMT, fecal microbiota transplantation

^aMedian (Q1, Q3); % (n) ^bWilcoxon rank sum test; Fisher's exact test; Pearson's χ^2 test

Résultats (3)

Effets indésirables lors du suivi des receveurs

P-value

Discussion - Transmission?

- ❖ Détection par RT-PCR seulement
- ❖ RT-PCR $\neq$ preuve d'organisme vivant
- ❖ Viabilité de *D. fragilis* post-congélation douteuse⁴
- ❖ Preuve par séquençage shotgun?

→ Faible concentration + absence de bon génome de référence
= pas de preuve formelle

Discussion (2)

- ❖ Cycle de vie encore incompris et transmission à prouver^{5,6}
- ❖ Premières données suggérant une transmission par TMF⁷
- ❖ Similitude avec *B. hominis*⁸
- ❖ Appuie l'hypothèse d'un **stade kystique** chez *D. fragilis*⁹
- ❖ **Pas d'effet clinique** chez receveurs !
- ❖ Détection seule ne justifie pas l'exclusion des donneurs
- ❖ *D. fragilis*, témoin de **diversité du microbiote** ?

5. Hall et al. Parasitology 2024 ; 151:337–345.

6. Stark et al. J Clin Microbiol 2014 ; 52:2680–2683.

7. Moreno-Sabater et al. Int J Antimicrob Agents 2025 ; 107541–1.

8. Terveer et al. Clin Infect Dis 2019 ; 71:2630–2636.

9. Stensvold et al. Int J Antimicrob Agents 2025 ; 107541–1.

Conclusions / A retenir

- ❖ *D. fragilis* ≠ facteur d'exclusion pertinent
- ❖ Inclusion donneurs positifs possible et sûre
- ❖ Améliore accès aux traitements TMF
- ❖ Repenser les critères de sélection actuels !

Remerciements

Co-auteurs:

Maladies Infectieuses – TMF

(CHUV)

Dr K.T. Galpérine

Dr A. Ballif

APHP – Pitié Salpêtrière

Prof. Nathalie Kapel

Microbiologie (CHUV)

Prof. C. Bertelli

Dr D. Jacot

E. Montenegro Borbolla

Dr T. Pillonel

Pharmacie (CHUV)

Dr S. Gerber

M. Audry

C. Stampfli

Swiss TPH (Université de Bâle)

M. Concu

Dr B. Nickel

Dr M.-T. Ruf

Equipe TMF (CHUV)

A. Mitouassiyou

F. Aparicio

V. Sormani

Prof. B Guery

Merci aux
donneurs!

Références

1. Décision ANSM 07.04.2025 [Internet]. ANSM. 2025 [cited 2025 Jun 4]. Available from: <https://ansm.sante.fr/actualites/decision-du-07-04-2025-definissant-les-regles-de-bonnes-pratiques-relatives-a-la-collecte-au-controle-a-la-conservation-a-la-tracabilite-et-au-transport-des-selles-dorigine-humaine-prevues-a-lartide-l-513-11-2-du-code-de-la-sante-publique>
2. Shasha D, Grupel D, Treigerman O, et al. The clinical significance of *Dientamoeba fragilis* and *Blastocystis* in human stool—retrospective cohort study. *Clin Microbiol Infect* 2024 ; 30:130– 136.
3. Cacciò SM. Molecular epidemiology of *Dientamoeba fragilis*. *Acta Trop* 2018 ; 184:73–77
4. Hurych J, Vodolanova L, Vejmelka J, et al. Freezing of faeces dramatically decreases the viability of *Blastocystis* sp. and *Dientamoeba fragilis*. *Eur J Gastroenterol Hepatol* 2022 ; 34:242– 243.
5. Hall LM, Munasinghe VS, Vella NGF, Ellis JT, Stark D. Observations on the transmission of *Dientamoeba fragilis* and the cyst life cycle stage. *Parasitology* 2024 ; 151:337–345.
6. Stark D, Garcia LS, Barratt JLN, et al. Description of *Dientamoeba fragilis* Cyst and Precystic Forms from Human Samples. *J Clin Microbiol* 2014 ; 52:2680–2683.
7. Moreno-Sabater A, Sintes R, Truong S, Lemoine K, Camou O, Kapel N, et al. Assessment of *Dientamoeba fragilis* interhuman transmission by fecal microbiota transplantation. *Int J Antimicrob Agents* 2025 ; 66(2):107504
8. Terveer EM, Gool T van, Ooijevaar RE, et al. Human Transmission of *Blastocystis* by Fecal Microbiota Transplantation Without Development of Gastrointestinal Symptoms in Recipients. *Clin Infect Dis* 2019 ; 71:2630–2636.
9. Stensvold CR, Tomiak J, Seyoum Y, Nielsen HV, Mark. Letter to the Editor: Comment to “Assessment of *Dientamoeba fragilis* interhuman transmission by fecal microbiota transplantation” by Moreno-Sabater et al. (2025). *Int J Antimicrob Agents* 2025 ; 107541–1.

Les illustrations ont entièrement été réalisées par l’auteur en utilisant Biorender (www.biorender.com) et les outils Microsoft Office.