



Introduction

- 70% des patients hospitalisés sont porteurs d'un cathéter veineux périphérique.
- La première complication liée à ce dispositif est la veinite.
- Il n'existe pas de consensus international dans le traitement des veinites symptomatiques sur CVP.
- Cette étude observationnelle, avait pour objectif principal de décrire les pratiques infirmières en France dans la prise en charge de cette complication.

Méthode

- Un questionnaire en ligne a été conçu par une équipe multidisciplinaire du CHRU de Tours.
- Les Conseils Régionaux de l'Ordre National de Infirmiers (ONI) ont été sollicités afin de diffuser le questionnaire par mails aux membres inscrits dans leurs régions respectives.
- L'enquête s'est déroulée du 31 mars 2023 au 30 avril 2023.




Résultats

Ce questionnaire en ligne a été envoyé par e-mail dans 3 régions françaises (Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes), et dans les Départements d'Outre-Mer (La Réunion et Mayotte), par le biais de l'ONI. Le questionnaire a été envoyé à 126 297 infirmiers, pour un total de 3038 réponses, soit 2,41 % de taux de réponse.

Caractéristiques de la population

Professions / Fonctions	Total N = 3038
Infirmiers	2870
Cadres de santé	81
Infirmiers référents hygiène	57
Infirmiers anesthésistes / bloc / autres	30

Répartition des traitements utilisés par les répondants pour les veinites symptomatiques sur CVP




Satisfaction des répondants dans l'efficacité des traitements utilisés pour les veinites sur CVP

- Les participants utilisant un traitement symptomatique pour les veinites sur CVP se déclaraient significativement plus satisfaits ou très satisfaits de leur efficacité que ceux n'en utilisant aucun (2449/2970 (82,4%) vs 43/68 (63%), $p < 0,0001$).

Pansement alcoolisé à 70° : modalités d'applications

92,40 % des répondants ont mentionné appliquer le pansement alcoolisé à 70° sans prescription médicale



Conclusion

Cette enquête nationale sur la prise en charge des veinites sur cathéters veineux périphériques met en évidence :

- Les répondants utilisent principalement le pansement alcoolisé à 70°, dans la grande majorité des cas sans prescription médicale.
- Cependant, aucune étude n'a comparé l'efficacité de cette stratégie thérapeutique à une autre ou au placebo dans ce contexte !
- Des travaux de recherche complémentaires sont nécessaires pour proposer aux patients une prise en charge fondée sur des données probantes.

