

Connaissance et recours à la PrEP chez les HSH nés en Afrique subsaharienne

Damien Trawale

JNI 2026

Introduction (1)

Vulnérabilité des personnes immigrées face au VIH

2024 : 56% des personnes qui ont découvert leur séropositivité sont nées à l'étranger et 37% sont nés en Afrique subsaharienne (SPF, 2025)

Parcours

Parcours de vie et santé des
Africains immigrés en France



Sous la direction de Annabel Desgrées du Loû
France Lert

Période de précarité de 7 ans qui fait suite à la migration (travail, logement, papiers)

Période au cours de laquelle, ils.elles sont surexposé·es à une contamination au VIH

Une part importante de subsaharien·nes se contaminent après leur installation en France



Recherches

Introduction (2)

Vulnérabilité des HSH nés en Afrique subsaharienne

Augmentation des nouvelles contaminations jusqu'en 2022 (SPF, 2025)



Palich et al., 2024

58,6% des HSH nés en Afrique subsaharienne se sont contaminés au VIH après leur arrivée en France

Parmi les HSH nés à l'étranger, les HSH nés en Afrique subsaharienne ont le risque relatif le plus élevé de se contaminer lors de la 1^{ère} année de vie en France

Accès à la PrEP pour les HSH nés en Afrique subsaharienne → Enjeu majeur de santé publique

Comment varient la connaissance et le recours à la PrEP chez les HSH nés en Afrique subsaharienne ? Si moindre recours, manque d'opportunité ou faible acceptation de la PrEP ?

Introduction (3)

Méthode :

Données quantitatives issues des activités de dépistage et sensibilisation en Aller vers de l'association Afrique Avenir

Association qui intervient en Île-de-France principalement auprès des populations originaires d'Afrique subsaharienne et des Caraïbes en France depuis 1994

Collecte de données: 02/2019 – 06/2024 → $n = 17888$

Données qualitatives : entretiens avec des HSH nés en Afrique subsaharienne réalisés dans le cadre d'un postdoctorat sur leurs trajectoires (2021-2023)

1. Les HSH nés en ASS accompagnés par Afrique Avenir (1)

	n	%
France hexagonale	387	30
Afrique subsaharienne	600	46.6
Autres	300	23.3
NA	1	0.1
Total	1288	100

1 288 répondants HSH dont 600 nés en ASS

Autres = modalité résiduelle

Des HSH nés en Afrique subsaharienne **très précaires** : 44% n'ont pas d'activité pro (contre 18% pour ceux nés en France) et 44% déclarent ne pas avoir de logement stable (contre 8% pour ceux nés en France)

Journée sans repas au cours du mois précédant l'enquête :

19% des HSH nés en ASS n'ont aucune couverture santé

19% n'ont pas de titre de séjour et 37% ont des titres de séjour de moins d'un an

	1. Oui	2. Non	Total
France hexagonale	2	98	100
Afrique subsaharienne	16	84	100
Autres	5	95	100
Ensemble	9	91	100

1. Les HSH nés en ASS accompagnés par Afrique Avenir (2)


	Bisexuel	Homosexuel	Total
France hexagonale	25	75	100
Afrique subsaharienne	20	80	100
Autres	28	72	100
Ensemble	24	76	100

La protection par le préservatif lors de la dernière relation occasionnelle est plus fréquente pour les HSH nés en ASS (non utilisateurs de la PrEP)


Part un peu plus importante des HSH subsahariens ayant uniquement des relations sexuelles avec d'autres hommes

Ils déclarent plus souvent des relations stables (63% contre 49% pour les HSH nés en France)

Et moins souvent des partenaires occasionnels (20% n'en déclarent aucun contre 17% pour ceux nés en France)




2. Le rapport à la PrEP (1)




Connaissance plus faible de la PrEP

Effet net de l'origine ou effet de caractéristiques (précarité) qui distinguent les HSH nés en ASS ?




Malgré plus faible propension à connaître la PrEP, une utilisation comparable → rapport connaissance / recours plus favorable pour les HSH nés en ASS

2. Le rapport à la PrEP (2)



Moins de propositions de PrEP

Lié à moindre déclaration de relations occasionnelles, notamment



Forte acception lorsque la PrEP est proposée

Non recours des HSH nés en ASS qui pourraient en avoir besoin apparait plus lié à un **déficit de connaissance** du dispositif qu'à un refus d'y recourir

Variable	OR	95% CI	p-value
region_naiss_3cl			
France hexagonale	—	—	
Afrique subsaharienne	1.64	1.14, 2.35	0.007
Autres	1.03	0.70, 1.53	0.87
situ_k_3cl			
1. Temps plein	—	—	
2. Temps partiel / Petit boulot	1.17	0.69, 1.95	0.56
3. Pas d'activité	1.34	0.95, 1.87	0.093
4. Etudiant	1.76	1.15, 2.70	0.009
age_cat2			
25-29 ans	—	—	
15-19 ans	3.20	1.74, 5.91	<0.001
20-24 ans	1.08	0.72, 1.63	0.70
30-34 ans	1.47	0.95, 2.28	0.087
35-39 ans	1.70	1.00, 2.88	0.050
40-49 ans	1.79	1.09, 2.93	0.022
50 ans et plus	2.16	1.12, 4.12	0.020
secu_reg			
PUMA + Complementary	—	—	
Aucune Couverture	5.62	3.62, 8.80	<0.001
AME	4.21	2.36, 7.57	<0.001
Assurance	2.51	1.29, 4.84	0.006
PUMA	1.43	1.03, 2.00	0.032
OS_def			
Homosexuel	—	—	
Bisexuel	2.50	1.83, 3.42	<0.001
R2_12			
1. Oui	—	—	
2. Non	2.16	1.52, 3.05	<0.001

M1 : région de naissance, situation vis-à-vis de l'emploi, âge, couverture santé, « orientation sexuelle », partenaires occasionnel·les au cours des 12 derniers mois

Plus forte contribution nette, **couverture santé** : ceux sans couverture ont 5,62 fois plus de risque de ne pas connaître la PrEP

L'âge a également un effet important : risque de ne pas connaître la PrEP pour les plus jeunes (OR = 3,20) et les plus âgés (OR = 2,16)

Les **bisexuels** et ceux qui ne déclarent **aucun rapport occasionnel** au cours des 12 derniers mois connaissent également moins la PrEP

L'origine joue un rôle, les **HSH nés en Afrique subsaharienne** ont 1,64 fois plus de risque que ceux nés en France de ne pas connaître la PrEP

Effet net de l'origine pourrait être du à précarité administrative mais pb d'introduire cette variable dans ce modèle → M2 : compare les « Autres » HSH à ceux nés en Afrique subsaharienne

Variable	OR	95% CI	p-value
region_naiss_2cl			
Autres	—	—	
Afrique subsaharienne	1.58	1.06, 2.36	0.025
situ_k_3cl			
1. Temps plein	—	—	
2. Temps partiel / Petit boulot	1.08	0.60, 1.92	0.80
3. Pas d'activité	1.31	0.86, 2.01	0.21
4. Etudiant	1.53	0.88, 2.66	0.13
age_cat2			
25-29 ans	—	—	
15-19 ans	1.87	0.82, 4.25	0.13
20-24 ans	1.03	0.65, 1.64	0.89
30-34 ans	1.36	0.84, 2.21	0.21
35-39 ans	1.53	0.84, 2.79	0.17
40-49 ans	2.33	1.29, 4.23	0.005
50 ans et plus	2.66	1.12, 6.32	0.026
secu_reg			
PUMA + Complementaire	—	—	
Aucune Couverture	4.99	2.90, 8.67	<0.001
AME	3.70	1.90, 7.29	<0.001
Assurance	2.77	1.31, 5.84	0.007
PUMA	1.92	1.24, 2.98	0.004
titre_reg			
1. Nationalité Française	—	—	
2. Carte de séjour de 10 ans	1.78	0.97, 3.32	0.066
3. Titre de séjour un an et plus	1.64	0.88, 3.11	0.13
4. Titre de séjour court	1.73	0.87, 3.50	0.12
5. Aucun titre	2.32	1.06, 5.14	0.036
8. Autres	1.79	0.72, 4.37	0.20
OS_def			
Homosexuel	—	—	
Bisexuel	2.00	1.36, 2.95	<0.001
R2_12			
1. Oui	—	—	
2. Non	1.85	1.23, 2.79	0.003

M2 : même modèle sans les HSH nés en France et avec ajout de la variable titres de séjour

Tendances observées dans le M1 se maintiennent globalement

Précarité administrative joue un rôle dans la non connaissance de la PrEP, ceux qui n'ont pas de titre de séjour ont 2,32 plus de risque de ne pas la connaître que ceux qui ont la nationalité française

Le fait d'être né en Afrique subsaharienne semble néanmoins toujours jouer un rôle dans la moindre connaissance de la PrEP (OR = 1,58)

Characteristic	OR	95% CI	p-value
(Intercept)	0.41	0.19, 0.84	0.016
region_naiss_3cl			
France hexagonale	—	—	
Afrique subsaharienne	2.06	1.17, 3.65	0.012
Autres	1.41	0.79, 2.52	0.2
situ_k_3cl			
1. Temps plein	—	—	
2. Temps partiel / Petit boulot	0.96	0.44, 2.10	>0.9
3. Pas d'activité	2.12	1.24, 3.65	0.006
4. Etudiant	0.91	0.46, 1.81	0.8
age_cat2			
25-29 ans	—	—	
15-19 ans	0.94	0.36, 2.49	>0.9
20-24 ans	1.28	0.70, 2.35	0.4
30-34 ans	1.10	0.55, 2.22	0.8
35-39 ans	1.39	0.57, 3.47	0.5
40-49 ans	0.28	0.12, 0.64	0.003
50 ans et plus	1.23	0.47, 3.16	0.7
secu_reg			
PUMA + Comp	—	—	
Aucune Couverture	1.30	0.66, 2.59	0.4
AME	0.27	0.09, 0.80	0.019
Assurance	0.25	0.05, 0.91	0.050
PUMA	0.53	0.32, 0.87	0.013
OS_def			
Bisexuel	—	—	
Homosexuel	2.25	1.38, 3.72	0.001
R2_12			
1. Oui	—	—	
2. Non	0.31	0.10, 0.83	0.024

M3 : chances d'accepter la PrEP avec mêmes variables que M1

Confirme plus forte acceptation des HSH nés en ASS

Sécu + complémentaire santé favorisent l'acceptation

Personnes qui ont des relations avec des hommes et des femmes semblent se sentir moins vulnérables

Précarité semble renforcer le sentiment de vulnérabilité

Conclusion : comprendre l'effet net de l'origine

Non recours à la PrEP des HSH nés en Afrique subsaharienne qui pourraient en bénéficier semble moins lié à un refus du dispositif qu'à sa méconnaissance

Méconnaissance qui apparaît fortement liée à absence de couverture santé ou à une couverture limitée

Contribution nette du fait d'être né en Afrique subsaharienne pourrait être liée à la ségrégation raciale des réseaux et des espaces de sociabilité sexuelle

Bakary, 26 ans, Côte d'Ivoire

« Je ne support plus d'avoir à m'expliquer, à éduquer les gens, leur dire de ne pas imiter l'accent de mes amis, euh, d'être fétichisé. Moi, perso, je n'ai plus de relation avec des Blancs, sauf s'ils sont wakes ».

Entretiens font ressortir que la PrEP est moins spontanément évoquée dans ces réseaux ségrégués

Diego, 28 ans, Bénin

« quand tu es Noir et que tu dis que tu es bi parce que quand tu es Noir et tu es bi, automatiquement « ah, c'est parce que tu viens d'Afrique. Non, c'est parce que tu es homosexuel à 100% mais comme tu viens d'Afrique, tu n'as pas envie de faire de la peine pour tes parents donc tu te mets avec une femme ». Non, on peut être bisexuel, avoir des rapports avec des hommes et des femmes, ça existe ».