








Introduction

L’antibiorésistance est un défi majeur de santé publique et le bon usage des antibiotiques (BUA) est crucial pour la limiter. Les infirmiers (IDE) jouent un rôle clé dans leur préparation, administration et surveillance. Cependant des difficultés existent quant à la préparation et l’administration des antibiotiques (ATB). L’objectif de travail est d’analyser les pratiques professionnelles des IDE sur le BUA en milieu hospitalier et d’identifier les difficultés en lien avec l’utilisation des ATB.

Matériel et Méthodes

- Enquête via un questionnaire en ligne (outils Skezia®)
- Avril et mai 2025
- IDE de divers services
- Les questions portaient sur le suivi des prescriptions, les difficultés d’administrations (dosage, dilution, durée de perfusion), l’accès à la documentation et des cas pratiques.



Résultats

- 117 réponses (72 complètes)
- 90 % savent qu’un antibiotique n’est pas systématique en cas de fièvre
- 63 % suivent strictement les prescriptions
- 85 % ont rencontré des difficultés (durée de perfusion non précisée, dilution incohérente, etc.)
- 57 % savent où trouver des informations sur les dilutions
- 28 % jugent les documents incomplets
- cas pratiques pour l’**Amoxicilline IV** :
 - 87 % utilisent 250 ml de NaCl (conforme)
 - 5 % utilisent du G5% (non recommandé),
- **Vancomycine 2g/24h** 74 % optent pour une IVSE de 48 ml (non recommandée)
- **Tazocilline®** :
 - 53 % perfusent sur 30 min, et non sur 4 heures (efficacité optimale.)

Conclusion

Les résultats montrent des écarts entre pratiques et recommandations liés à des prescriptions imprécises, un manque d’outils clairs et des contraintes organisationnelles. Une formation renforcée et des protocoles standardisés pourraient améliorer la sécurité des soins. L’intégration des IDE dans des programmes de formation continue et leur implication dans des structures comme le Centre Régional en Antibiothérapie (CRAb) sont essentielles pour harmoniser les pratiques et lutter contre l’antibiorésistance.