


Objectifs de l'enquête

- Évaluer les connaissances et la pratique des médecins généralistes concernant le vaccin coqueluche


Pourcentage de médecins proposant un RVC chez l'adulte dans les différentes situations correspondant aux recommandations (2007)



➤ Seuls 13,6% appliqueraient pleinement les recommandations

Résultats 2

- délai en-dessous duquel le vaccin dTcaPolio peut être administré après un dernier rappel dTPolio (Répartition des réponses des médecins)



faible connaissance du délai minimum entre 2 vaccinations dTPolio et dTcaPolio

Difficultés rencontrées par les médecins

Population cible difficile d'accès pour le médecin généraliste

	Pourcentage	(Effectif)
Aucune difficulté	47,1%	(n=90)
Y penser lors d'un autre motif de consultation	31,9%	(n=61)
Jeunes adultes peu vus en consultation pour une prévention	25,7%	(n=49)
Peu de conseils demandés au médecin avant une grossesse	24,6%	(n=47)
Femmes enceintes peu suivies en médecine générale	23,6%	(n=45)
Visite initiale du nouveau-né échappant au généraliste	12,6%	(n=24)
Large tranche d'âge concernée par cette vaccination	9,4%	(n=18)
Autres cas	2,6%	(n=5)

AMÉLIORATIONS

- 63,4% des médecins favorables au fait de proposer le RVC dans le cadre d'une consultation préconception.
- 81,2 % favorables à plus d'information du grand public sur l'intérêt de ce vaccin
- 58,1 % favorables à la mise sur le marché d'un vaccin coquelucheux monovalent.

Difficultés d'application de la recommandation du rappel vaccinal coquelucheux chez l'adulte


S. Wendling, P. Perrin, N. Lefebvre, G. Camuset, D. Christmann,
Y. Hansmann

Services des Maladies Infectieuses
Hôpitaux Universitaires Strasbourg




CONSTAT

- Recrudescence des cas de coqueluche chez les petits nourrissons et les adultes malgré l'efficacité du vaccin



- Indication d'un rappel vaccinal chez l'adulte depuis 2004, modifié en 2008 (rappel décennal à 26-28 ans) pour diminuer la transmission réservoir adulte ⇒ enfant

Cas de coqueluche signalés par les bactériologistes de Renacoq par an, 1996-2007 et données provisoires pour 2008 (au 27/02/2009)



CONCLUSION

- *Faible application des recommandations ciblées de la stratégie familiale : nécessité d'une compréhension des recommandations par les médecins pour les appliquer*
- *Population cible de cette vaccination difficile d'accès pour le médecin généraliste : intérêt d'une consultation préconception*

MÉTHODE

- Enquête de pratiques
 - Questionnaires envoyés à 1/3 des médecins généralistes du Bas-Rhin (350/1020)
 - Taux réponse 54,6% : 191 médecins inclus
- Objectifs principaux :
 - Évaluer les connaissances et la pratique des médecins généralistes concernant le vaccin coqueluche
 - Évaluer les obstacles rencontrés
 - Évaluer les voies d'amélioration

• Statut vaccinal des médecins

- 26,2% vaccinés contre la coqueluche

MAIS confusion « est vacciné » - « a été vacciné »

