


- **Enquête un jour donné** n°1 (février 2005) sur les prescriptions de FQ menée dans tous les services de l'hôpital
- **Retour d'information aux prescripteurs** (septembre 2005 à mars 2006)
- Elaboration et diffusion d'une **plaquette de recommandations sur le bon usage des FQ** (septembre 2005)
- Mise en place d'une **équipe mobile transversale de conseil en antibiothérapie** (janvier 2007)
- **Evaluation impact de l'action**
 - **Enquêtes un jour donné n°2 et 3** (janvier 2007 et novembre 2008)
 - **Consommation d'antibiotiques (DDJ/1000 JH)** et particulièrement des FQ


	Audit n°1 2005	Audit n°2 2007	Audit n°3 2008
Patients hospitalisés (n)	503	482	550
Patients traités par antibiotiques (n,%)	226 (45 %)	201 (42 %)	201 (36 %)
Patients traités par FQ (n)	49	30	23
% de patients hospitalisés traités par FQ	9,7%	6,2 %	4,2 %
Prescriptions de FQ injectable	45%	27%	35%
Utilisation des FQ en traitement empirique	74%	50%	62%
Durée médiane de traitement au jour de l'enquête (jours, min-max)	7 (1-24)	5 (1-15)	5 (1-12)
Indications appropriées	58%	50%	65%
Utilisation de la voie intraveineuse justifiée	73%	63%	75%
Dose unitaire appropriée	90%	90%	90%
Rythme d'administration approprié	92%	93%	95%

La conformité des prescriptions a été évaluée selon les recommandations de l'AP-HP (2003) et classées en « appropriées » (conformes aux recommandations), « non appropriées » ou « acceptables » .


Activité référent, nombre d'avis donnés/mois




Retour d'info
 plaquette ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Total fluoroquinolones Equipe mobile




Total antibiotiques



Ciprofloxacin



Ofloxacin



■ : IV

■ : *Per os*