

K- 17



**DÉTERMINANTS DE LA VACCINATION
ANTIGRIPPALE
CHEZ LES SOIGNANTS**

Braquet P¹, Baptista G², Le Moing V¹, Jeandel C²,
Le Quellec A³, Salmon D⁴, Reynes J¹

¹Maladies infectieuses et tropicales CHRU Montpellier

²Pôle de gériatrie CHRU Montpellier

³Médecine interne et maladies multiorganiques CHRU Montpellier

⁴Maladies infectieuses et tropicales CHU Cochin Paris



Courrier: Pierre Braquet 50, impasse Avicenne 34090 Montpellier
pit_braquet@hotmail.com

INTRODUCTION

Malgré la recommandation de vaccination antigrippale annuelle pour les soignants en France depuis 2000, la couverture reste à un niveau insuffisant. Cette enquête vise à déterminer les facteurs sociodémographiques, les connaissances et les opinions qui influencent la vaccination.

MÉTHODES

Un sondage dans les unités de soins a été réalisé en avril 2012 chez 217 soignants de médecine adulte au CHRU de Montpellier. Les services concernés sont la gériatrie (court, moyen et long séjours), un service de médecine interne et le service de maladies infectieuses et tropicales.




Fig. 1: Vaccinés / Effectifs en fonction de l'unité de soins et du métier


Questions posées à 217 soignants	Oui	% de vaccinés si oui	% de vaccinés si non	p (chi ²)
Le vaccin peut provoquer une infection par le virus de la grippe	41%	10%	35%	<0,0001
La vaccination contre la grippe peut éviter des décès	94%	23%	9%	0,68
Les effets indésirables du vaccin sont plus graves que la grippe elle-même.	11%	0%	26%	0,0014
Je suis moins susceptible pour attraper le virus de la grippe que la moyenne des gens.	23%	21%	25%	0,09
Avez-vous fait le vaccin contre la grippe une fois les 3 années précédentes ?	43%	51%	2%	<0,0001
C'est compliqué de se faire vacciner au travail.	7%	11%	24%	0,71
Êtes-vous favorable aux vaccins en général ?	83%	27%	0%	0,0005
Un adulte sain qui attrape la grippe a une fièvre élevée et peut rester au lit pendant quelques jours	95%	24%	0%	0,3

RÉSULTATS

Le taux de vaccination est de 23 % (49/217) pour 2011-2012 et la couverture varie en fonction du métier et de l'unité de soins. (fig 1) Une étude exploratoire à l'aide d'une analyse par correspondances multiples compare le profil des vaccinés par rapport aux non-vaccinés. (fig.2)

Le profil provaccinal est associé aux médecins et aux infirmiers, et à une justification de l'obligation vaccinale par la protection des patients. Le profil antivaccinal comporte l'opposition globale aux vaccins et le niveau d'études et de responsabilités faibles.

Fig. 2: Analyse des opinions par correspondances multiples



CONCLUSION

Les facteurs déterminants les plus forts de la vaccination antigrippale chez les soignants sont le métier, l'unité de soins, la volonté de protéger les patients et les connaissances sur le vaccin. L'information devrait se focaliser sur le rapport bénéfice-risque favorable pour les soignants et l'effet protecteur pour les patients.