

EVALUATION DES CONNAISSANCES SUR L'INFECTION VIH LORS DE LA CONSULTATION INITIALE D'ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE



Emma Torres, Carine Pifaut, Catherine Gachenot, Chantal Chevreau, Nadia Valin, Pierre-Marie Girard, Jean-Luc Meynard
Service des Maladies Infectieuses et Tropicales, Hôpital Saint Antoine, Paris

Evaluation des connaissances des patients Pourquoi ?

- Nécessité de trouver un outil construit et partagé par le groupe
- Évolutif
- Permet d'aborder différentes thématiques avec les patients
- Recommandé dans le cadre des programmes validés par l'ARS

Objectifs

- Evaluer le niveau global de connaissance des patients sur l'infection par le VIH (transmission, pathologie, antirétroviraux)



Méthodes

1. Création d'une fiche par le groupe d'éducation thérapeutique.
2. Remise de la fiche au début de l'entretien.
3. Réévaluation des connaissances avec le patient .
4. Analyse descriptive des résultats.

Résultats

La fiche comportant 15 questions a été distribuée entre le 01/01/2012 et le 31/12/2012, à 151 patients infectés par le VIH lors du bilan annuel de synthèse.

- Age médian : 49 ans (de 21 à 70 ans)
- Durée de l'infection par le VIH : 14 ans (de 2 mois à 28 ans)




Q1 L'utilisation systématique du préservatif pendant le rapport sexuel empêche la transmission du VIH

Q2 Le VIH peut se transmettre quand on embrasse une personne sur la bouche

Q3 Le risque de transmission du VIH est diminué lorsque la charge virale est indétectable

Q4 Une femme peut transmettre le VIH à son enfant lors de l'accouchement



Q5 On peut prendre les médicaments à n'importe quel moment de la journée, quand on y pense

Q6 Les CD4 ou T4 sont les globules blancs qui sont le reflet des défenses de notre corps

Q7 La charge virale augmente quand on prend un traitement

Q8 Si on vomit les médicaments, on ne doit pas les reprendre




Q9 En cas d'effets indésirables on doit arrêter le traitement

Q10 Si le traitement est mal pris ou oublié, le virus s'habitue aux médicaments et les rend inefficaces :

Q11 Le Virus du VIH peut augmenter le risque de maladie cardiovasculaire

Q12 Si on a de la diarrhée, il faut manger du riz et attendre que cela passe



Q13 A l'hôpital, la seule personne à qui on peut parler de la maladie c'est le médecin

Q14 On peut prendre d'autres médicaments sans en parler à son médecin

Q15 Tous les vaccins sont autorisés lorsque l'on est séropositif au VIH

Conclusion :

- cette étude montre que malgré une prise en charge de l'infection VIH depuis de nombreuses années, le niveau de connaissance des patients doit être amélioré.
- Cet outil permet une réactualisation des connaissances et l'acquisition de compétences pour mieux gérer leur maladie et leur traitement.
- Cette étude a permis à l'équipe pluridisciplinaire de s'impliquer dans un programme d'évaluation des Pratiques Professionnelles (EPP).