



Vécu et connaissance des Tests Rapides d'Orientation Diagnostique (TROD) pour le VIH.

Abstract

Objectifs : Evaluer les connaissances des TROD, les motivations du dépistage, et connaître le vécu de l'attente des résultats.

Matériels et méthodes :

Enquête sur les TROD, réalisée pour la journée du 1er Décembre 2012 dans le hall d'un hôpital de Seine-Saint-Denis, par auto-questionnaires proposés avant la réalisation du TROD. Les thèmes abordaient les connaissances du VIH, des TROD et le vécu de l'attente. L'encadrement était effectué par une équipe pluridisciplinaire (médecins, infirmiers et psychologues).

Résultats : Cent sept personnes ont été dépistées, moyenne d'âge 27 ans, majoritairement élèves infirmiers et personnels hospitaliers, d'origine caucasienne 57% (n=53) et africaine 25% (n=23). Très peu (17%, n=18) ont une connaissance antérieure des TROD; 35,5 % (n=38) ont pris des risques sexuels dans les 3 derniers mois; 1er test pour 40% (n=43) des dépistés. La moitié ne connaît pas le délai de fiabilité des TROD. Les personnes dépistées sont plutôt confiantes dans l'attente du résultat (40%, n=43) et ont une bonne perception du délai d'attente (75%, n=81). Ce délai permet une réflexion de prévention (comportements et pratiques sexuelles) mais peu d'anticiper un résultat positif ni d'interroger les soignants. Les participants ont jugé que les TROD devaient être utilisés en milieu de soin (hôpital : 77%, cabinet médical : 64 %, laboratoire : 42 %). Deux résultats (1,8%) n'ont pas été négatifs.

Conclusions : Méconnaissance mais très bonne acceptation des TROD-VIH proposés au tout venant dans un hall d'hôpital. L'utilisation de ce mode de dépistage doit rester pour la majorité des personnes interrogées possible uniquement dans un milieu médicalisé. En revanche, le temps d'attente a été jugé insuffisant par les professionnels pour effectuer un travail d'information et de prévention.

Journée du 1er Décembre 2012


Etude réalisée à partir de 107 questionnaires proposés aux bénéficiaires de TROD, à l'occasion de la Journée du 1er Décembre 2012 dans le hall de l'hôpital Delafontaine à Saint-Denis

- Equipe PSY-VIH du Comité Sida Sexualités et Prévention de Ville-Evrard : COREVIH Est- Ile de France
- Equipe de l' Hôpital Delafontaine à St Denis COREVIH Nord-Ile de France : Médecins


Equipe para-médicale : C. Elia, J. Aouate

Questionnaire élaboré par :

- J. Phalip-Le Besnerais, Psychologue, et D. Le Paslier, Psychologue en formation, CSSP de Ville-Evrard, détachée au SMIT, Hôpital Delafontaine
- M.A. Khuong, C. Charpentier, J. Krause, M. Poupard, Médecins SMIT, Hôpital Delafontaine



107 personnes interrogées
Moyenne d'Age : 27 ans [14;66]



TEST DÉJÀ FAIT AUPARAVANT

- 64 personnes ont déjà fait un test pour le VIH (60 %) dont :
 - Test classique : 51 pers (47,7 %)
 - TROD : 3 pers (2,8 %)
 - Non répondu : 10 pers (9,4%)

PRISE DE RISQUE DANS LES 3 DERNIERS MOIS

- 38 personnes ont pris des risques sexuels dans les trois derniers mois, soit 35,50 %

CONNAISSANCE DU TROD

- 17 % des personnes interrogées avaient connaissance du TROD auparavant

MOTIVATIONS DU TEST

- Dépistage spontané : 44,8 %
- Affiche Hôpital : 33,6 %
- Dépistage proposé : 28 %
- Résultat immédiat : 27,1 %
- Gratuité : 23,40 %
- Bouche à oreille : 17,7 %
- Conduites à risque : 11,20 %
- J'accompagne quelqu'un : 4,70 %
- Autre : 1,90 %
- Radio : 0,90 %
- Maladies : 0,90 %
- Journaux : 0 %
- Grossesse : 0 %
- Partenaire(s) séropositif(s) : 0 %

RESSENTI DANS L' ATTENTE DU RESULTAT DU TEST

- Confiant : 40,20 %
- Inquiet : 29,90 %
- Détendu : 28 %
- Soulagé : 3,7 %

DELAI DE FIABILITE DU TROD

Quel est le délai nécessaire entre la prise de risque et un résultat de TROD fiable ?

- 3 mois : 36,40 %
 - 48 Heures : 22,40 %
 - 6 semaines : 15,9 %
 - 15 jours : 8,4 %
 - Non répondu : 16,9 %
- réponses inexactes 46,70 %

PERCEPTION DES 5-10 MINUTES D'ATTENTE

- Bien : 75,70 %
- Trop long : 12,10 %
- Trop court : 3,7 %
- Non répondu : 8,5 %

LE TEMPS D'ATTENTE PERMET :

- De réfléchir aux comportements et pratiques sexuelles : 57,30 %
- D'anticiper un résultat positif : 18,70 %
- D'interroger les soignants sur les conduites à risque : 16,80 %
- Non répondu : 7,2 %


L' ANNONCE DU RESULTAT DOIT PERMETTRE :

- Une prise en charge médicale rapide si nécessaire : 60,70 %
- De recevoir une information suffisante : 38,30%
- Un nouveau contrôle si le résultat n'est pas négatif : 28 %

LE TROD DOIT ETRE UTILISE :

- A l'hôpital : 77,60 %
- En cabinet médical : 64,50 %
- En laboratoire : 42 %
- Au domicile : 24,30 %
- A la sortie du métro : 6,50 %
- Sur la place du marché : 4,70 %

| TEST RAPIDE POUR LE VIH | | N° TROD : _____ | |
|---|---|--|---------------------------|
| LE RESULTAT EN 10' : QU'EN PENSEZ-VOUS ? | | RESULTAT : _____ | |
| Homme <input type="checkbox"/> | Femme <input type="checkbox"/> | Age : _____ | Pays de naissance : _____ |
| * Connaissez-vous auparavant les TROD * ? <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON | | * Comment vous sentez vous en attendant le résultat du test : | |
| (*Test Rapide à Orientation Diagnostique) | | <input type="checkbox"/> Détendu <input type="checkbox"/> Confiant <input type="checkbox"/> Soulagé <input type="checkbox"/> Inquiet | |
| * Avez-vous déjà fait un test pour le VIH ? <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON | | * Quel est le délai nécessaire entre la prise de risque et un résultat de TROD fiable ? : | |
| Date : _____ | | <input type="checkbox"/> 48 h après une prise de risque <input type="checkbox"/> 6 semaines après une prise de risque | |
| <input type="checkbox"/> TROD <input type="checkbox"/> CLASSIQUE | | <input type="checkbox"/> 15 jours après une prise de risque <input type="checkbox"/> 3 mois après une prise de risque | |
| * Pensez-vous avoir pris un risque dans les 3 derniers mois : <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON | | * Perception des 5 - 10 minutes d'attente : | |
| * Motivations du test : | | <input type="checkbox"/> Trop long <input type="checkbox"/> Trop court <input type="checkbox"/> Bien | |
| <input type="checkbox"/> Dépistage spontané | <input type="checkbox"/> Grossesse | * Est-ce que ce temps va vous permettre : | |
| <input type="checkbox"/> Dépistage proposé | <input type="checkbox"/> Conduites à risque | <input type="checkbox"/> De réfléchir à vos comportements et pratiques sexuelles | |
| <input type="checkbox"/> Affiche hôpital | <input type="checkbox"/> Gratuité | <input type="checkbox"/> D'interroger les soignants sur les conduites à risque | |
| <input type="checkbox"/> Radio | <input type="checkbox"/> Résultat immédiat | <input type="checkbox"/> D'anticiper un résultat positif | |
| <input type="checkbox"/> Journaux | <input type="checkbox"/> Autre : ... | * L'annonce du résultat doit permettre : | |
| <input type="checkbox"/> Bouche à oreille | | <input type="checkbox"/> Une prise en charge médicale rapide si nécessaire | |
| <input type="checkbox"/> Maladies | | <input type="checkbox"/> Un nouveau contrôle si le résultat n'est pas négatif | |
| <input type="checkbox"/> Partenaire(s) séropositif(s) | | <input type="checkbox"/> De recevoir une information suffisante | |
| <input type="checkbox"/> J'accompagne quelqu'un | | * Pensez-vous que le TROD doit être utilisé : | |
| <input type="checkbox"/> Bouche à oreille | | <input type="checkbox"/> A l'hôpital <input type="checkbox"/> Au domicile <input type="checkbox"/> A la sortie du métro | |
| | | <input type="checkbox"/> En cabinet médical <input type="checkbox"/> Sur la place du marché <input type="checkbox"/> En laboratoire | |



conclusions

- Sur 107 Trod : 2 résultats n'ont pas été négatifs : une personne voulait avoir confirmation d'un test classique positif, l'autre personne n'avait jamais fait de test de dépistage et pensait avoir pris un risque dans les trois derniers mois.
- Plus d'un tiers ont pris des risques dans les 3 derniers mois ce qui limite la validation du TROD
- La population est bien spécifique puisqu'il s'agit majoritairement d'élèves infirmiers et du personnel hospitalier. Peu connaissent le TROD (17%)
- Pour beaucoup le Trod doit être utilisé dans des lieux médicaux, permettant une prise en charge médicale rapide si nécessaire, malgré tout, 24 % pensent que le domicile est un lieu adéquat.
- Les messages de prévention commencent à être entendu mais encore trop peu ont déjà fait un test (40 %)
- La population dans cette enquête répond positivement à un résultat en 10 minutes du test rapide pour le VIH.
- Le temps d'attente n'est pas suffisamment long pour effectuer un travail d'information et de prévention.