

# Perceptions et pratiques des médecins généralistes français à l'égard de la vaccination contre le méningocoque C

M. Le Maréchal<sup>1</sup>, N. Agrinier<sup>1,2</sup>, P. Verger<sup>3,4,5</sup>, C. Pulcini<sup>1,5,6</sup>

1. Université de Lorraine, EA 4360 APEMAC, Nancy, France; 2. Inserm, CIC 1433 CIC-EC, CHU Nancy, F-54000 Nancy; 3. École d'économie Aix Marseille, SESSTIM UMR 912, Inserm IR, Marseille, France; 4. ORS PACA, Marseille, France; 5. INSERM, F-CRIN, I-Reivac; 6. CHU de Nancy, Service de Maladies Infectieuses, Nancy, France

## RATIONNEL

- Depuis 2010, la vaccination contre le méningocoque C est préconisée chez<sup>1</sup> :

Le nourrisson à 12 mois

En rattrapage de 2 à 24 ans

- En 2013, la couverture vaccinale de ce vaccin était de<sup>2</sup> :

56 % à 24 mois


4 % chez les 20-24 ans

## OBJECTIF

- Décrire les perceptions des médecins généralistes (MG) vis-à-vis de cette recommandation vaccinale

## MÉTHODES

- Étude transversale : enquête nationale menée par téléphone et Internet en 2014 auprès d'un panel représentatif des MG français<sup>3</sup>
- Questionnaire sur les pratiques, attitudes, perceptions des MG français à l'égard de la vaccination



Analyse descriptive

Est-ce que vous proposez toujours ou souvent la vaccination :

Chez le nourrisson ?

En rattrapage de 2 à 24 ans ?

OUI 52 %

OUI 33 %

## RÉSULTATS

Pour ces deux comportements, les freins cités par les MG étaient :

Freins liés au médecin

- La recommandation de cette vaccination n'est pas claire (47 %)

Freins liés aux patients

- Les patients sous-estiment le risque de faire une méningite (22 %)
- Les patients sous-estiment la gravité des méningites bactériennes (21 %)
- Les patients ne connaissent pas l'existence de cette vaccination (20 %)
- Les patients craignent les effets secondaires du vaccin (12 %)
- Les patients ont des doutes sur l'efficacité du vaccin (4 %)

## CONCLUSION

- La recommandation de vaccination contre le méningocoque C est encore peu proposée.
- Le comportement des médecins semble être différent concernant la vaccination du nourrisson ou la vaccination de rattrapage.
- Les MG semblent percevoir de nombreux freins à cette vaccination, peu en relation avec la peur d'effets secondaires du vaccin.

[1] BEH 22 avril 2010 / n°14-15 Institut de Veille Sanitaire (InVS)

[2] <http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Couverture-vaccinale/Donnees/Meningocoque-C>

[3] Etude et résultats, DRESS <http://www.drees.sante.gouv.fr/publications.677.html>