

Fréquence et caractéristiques des hospitalisations parmi les personnes vivant avec le VIH en France en 2011 : résultats de l'enquête ANRS-Vespa2 appariée aux données du PMSI

K. Wilson d'Almeida¹, F. Lert², C. Aubrière¹, S. Nguengang¹, B. Spire³, R. Dray-Spira¹ et le groupe ANRS-Vespa2

1) Inserm U1136, Paris, 2) CESP, Villejuif, 3) Inserm U912, Marseille

Objectifs

Grâce aux avancées thérapeutiques des dernières décennies la prise en charge de la maladie VIH est devenue essentiellement ambulatoire. Néanmoins, d'autres problèmes de santé en lien avec le vieillissement de la population et le poids croissant des comorbidités influent de façon de plus en plus importante sur l'état de santé des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) et se traduisent par des hospitalisations. L'objectif de cette étude est de décrire la fréquence et les caractéristiques des hospitalisations parmi les PVVIH en France.

Méthodes


- Données issues de l'appariement entre l'enquête **ANRS-Vespa2**, conduite en **2011** auprès d'un échantillon représentatif des PVVIH suivies à l'hôpital en France métropolitaine et dans les DOMs, et les **informations du PMSI** pour la période 2009-2011.
- Analyse des facteurs associés à l'appariement (2047/2798 soit 73% en métropole ; 353/490 soit 72% dans les DOM, données non disponibles pour La Réunion): meilleur appariement pour les services ayant une file active <800 patients en Métropole.
- Analyses descriptives de la fréquence et de la durée des hospitalisations au cours des 12 mois précédant l'enquête parmi les participants ayant pu être appariés (Prise en compte des séjours d'hospitalisation complète (au moins 24h) en structures de court séjour, de soins de suite (SSR) ou en établissement psychiatrique, à l'exclusion des hospitalisations liées à un motif exclusivement obstétrical.
- Données pondérées et redressées, fournissant des estimations extrapolables à l'ensemble des PVVIH suivies à l'hôpital en 2011.

Résultats


En Métropole:

- **Taux d'hospitalisation dans l'année: 19.4%** (19.3% en MCO, 2.8% en SSR, 1.1% en psy)
- **Durée médiane de séjour: 5 jours** (IQR: 2-9)

Nombre d'hospitalisations dans les 12 derniers mois parmi les personnes hospitalisées



MOTIF D'HOSPITALISATION




*Diagnostic principal CIM 10


Dans les DOMs:

- **Taux d'hospitalisation dans l'année: 21.5%** (18.6% en MCO, 3.5% en SSR, 0.1% en psy)
- **Durée médiane de séjour: 7 jours** (IQR : 3-22)

Nombre d'hospitalisations dans les 12 derniers mois parmi les personnes hospitalisées



MOTIF D'HOSPITALISATION



*Diagnostic principal CIM 10

Conclusion

Les hospitalisations restent fréquentes parmi les PVVIH en France. Le VIH n'est le diagnostic principal que dans 2% des hospitalisations en métropole et 4% dans les DOMs. Les comorbidités les plus fréquentes donnant lieu à hospitalisation sont les tumeurs hors foie et les pathologies cardiovasculaires en métropole, les pathologies de l'appareil génito-urinaire et les maladies endocriniennes dans les DOMs. Comparativement, en population générale, les principaux motifs d'hospitalisation en 2011 sont les pathologies de l'appareil circulatoire et de l'appareil digestif. Les analyses seront poursuivies afin d'identifier les caractéristiques individuelles associées à ces hospitalisations.