


2012

**GUIDE DES RECOMMANDATIONS
DE PRISE EN CHARGE DES
INFECTIONS AIGUES EN EHPAD**



SOMMAIRE

CIRCONSTANCES DE LA PRESCRIPTION ANTIBIOTIQUE	3
ALLERGIE AUX PENICILLINES	3
BRONCHITES	4
PNEUMOPATHIES	5
INFECTIONS URINAIRES	6
INFECTIONS DIGESTIVES	9
INFECTIONS DE LA PEAU ET DES TISSUS MOUS	10
INFECTION OCULAIRE.....	12
ANTIBIOTHERAPIE EN CAS DE FIEVRE ISOLEE.....	12
TABLEAU RECAPITULATIF	13

Ces recommandations sont destinées à aider à la prise en charge des principales infections en situation d'urgence. Elles ont été établies à partir des recommandations les plus récentes.

Trois principes ont guidé la rédaction de cette plaquette :

- des propositions limitées de choix antibiotique dans chaque situation, tenant compte de l'écologie des EHPAD tout en favorisant l'épargne des molécules de réserve,
- des durées courtes de traitement, sans faire prendre de risque au patient,
- des modalités d'administration compatibles avec les spécificités des résidents d' EHPAD (voie IM au besoin).

Pour tout conseil antibiotique, vous pouvez joindre le référent en antibiothérapie de l'hôpital de votre secteur.

CIRCONSTANCES DE LA PRESCRIPTION ANTIBIOTIQUE

En dehors des états septiques sévères, **le traitement n'est généralement pas urgent**. La priorité est d'établir le diagnostic ; si l'examen clinique ne suffit pas à l'établissement d'un diagnostic satisfaisant, le recours à des examens complémentaire d'imagerie et/ou de biologie est nécessaire.

ALLERGIE AUX PENICILLINES

- Les allergies croisées entre les pénicillines et les céphalosporines sont de l'ordre de 5%. Une allergie à la pénicilline ne contre-indique donc pas systématiquement l'utilisation des céphalosporines,
- **Seuls les patients ayant une allergie de type I aux pénicillines** (urticaire, bronchospasme, oedème de Quincke ou choc anaphylactique) doivent **bénéficier d'une alternative**,
- Un patient ayant présenté une allergie **non de type I** peut être traité en 1ère intention par une céphalosporine,
- Un patient **avec une notion d'allergie à une pénicilline mais dont l'interrogatoire est impossible** ou bien s'il y a un doute sur une réaction de type I : trouver une alternative thérapeutique.

BRONCHITES

	Contexte	Traitement	Durée	
	Bronchite aiguë	Syndrome grippal, contexte épidémique.	Abstention	
Penser à la vaccination antipneumococcique et antigrippale chez les patients BPCO	Exacerbation de BPCO	<u>Stade 0 ou I</u> Symptômes chroniques inconstants, pas de dyspnée d'effort	Abstention	
		<u>Stade II</u> Symptômes chroniques fréquents, dyspnée d'effort	Abstention sauf si expectoration franchement purulente Amoxicilline 1g×3/j PO Allergie type I Pristinamycine 1g×3/j PO	7 jours
		<u>Stade III</u> Symptômes chroniques quasi constants, dyspnée de repos ou au moindre effort ou > 4 exacerbations/an	Amoxicilline-acide clavulanique 1g×3/j PO Allergie de type I Pristinamycine 1g×3/j PO Si voie orale impossible Ceftriaxone 1g/j IV/IM/SC	7 jours

PNEUMOPATHIES

Contexte		Traitement	Durée
Pneumopathie aigue Penser à la vaccination antipneumococcique	Début brutal, foyer de crépitations, fièvre élevée, frissons, douleurs thoraciques, opacité systématisée Globules blancs ↑↑(neutrophiles), PCT(procalcitonine) et CRP ↑↑	Amoxicilline-acide clavulanique 1g×3/j PO Allergie de type 1 Pristinamycine 1g×3/j PO Si voie orale impossible Ceftriaxone 1g/j IV/IM/SC	7 jours
Suspicion d'inhalation	Trouble de déglutition, foyer de crépitations droit	Amoxicilline-acide clavulanique 1g×3/j PO Ou Ceftriaxone 1g/j IV/IM/SC + Métronidazole 500mg×3/j PO	7 jours
Pneumopathie aigue sévères ou échec à 48 h du traitement de première intention	Transfert SAU	Ceftriaxone 1g /j IV/IM/SC + Spiramycine, 3 MU×3/j PO ou IV si possible.	

INFECTIONS URINAIRES

Contexte		Traitement	Durée
Bactériurie asymptomatique	Extrêmement fréquente chez la personne âgée institutionnalisée: en cas de fièvre inexpliquée, chercher une autre cause avant d'incriminer un ECBU positif.	Pas d'indication à une antibiothérapie	
Cystite aiguë de la femme ECBU impératif avant traitement	Signes fonctionnels urinaires isolés + ECBU positif	<p><u>Avant résultats ECBU</u> Fosfomycine 3 g monodose</p> <p><u>Après antibiogramme</u> Fosfomycine-S: rien de plus Fosfomycine-R : - Amoxicilline 1g×3/j Ou - Cotrimoxazole Forte PO 1cp×2/j</p> <p>Si situation d'échec et clairance rénale >30ml/min Nitrofurantoïne 50mg×3/j</p> <p>Eviter les fluoroquinolones si possible</p>	<p>5 jours</p> <p>5 jours</p>

<p>Pyélonéphrite aigüe</p> <p>ECBU impératif avant traitement</p>	<p>Signes fonctionnels urinaires + hyperthermie ou sd confusionnel en l'absence d'autre cause + ECBU positif + sd inflammatoire biologique</p>	<p><u>Avant résultats ECBU</u> Ceftriaxone 1g/j IM/SC/IV</p> <p><u>Après antibiogramme, privilégier :</u> - Amoxicilline PO 1g×3/j Ou - Cotrimoxazole forte PO 1cp×2/j</p> <p>Eviter les fluoroquinolones si possible</p> <p>Allergie de type I : <u>Avant résultats ECBU :</u> Ofloxacin 200 mg ×2/j PO + 1 seule injection de gentamicine 6-8 mg/kg IM/IV</p> <p><u>Après antibiogramme privilégier :</u> - Cotrimoxazole forte PO 1cp×2/j Ou - Ofloxacin 200 mg ×2/j PO</p>	<p>10 jours au total</p> <p>10 jours au total</p> <p>7 jours au total</p>
<p>Cystite de l'homme âgé</p> <p>Prévoir un bilan urodynamique à distance</p>	<p>Signes fonctionnels urinaires isolés + ECBU positif</p>	<p><u>Après antibiogramme:</u> - Cotrimoxazole Forte PO 1cp×2/j Ou - Amoxicilline 1g×3/j</p> <p>Eviter les fluoroquinolones si possible</p>	<p>7 jours au total</p>

Prostatite aiguë	Signes fonctionnels urinaires + hyperthermie ou sd confusionnel en l'absence d'autre cause + ECBU positif + sd inflammatoire biologique	<p><u>Avant résultats ECBU</u></p> <p>- Ceftriaxone 1g/j IM +/- (si situation sévère avant transfert au SAU) 1 seule injection de gentamicine 6-8 mg/kg IM/IV</p> <p><u>Après antibiogramme</u></p> <p>- Cotrimoxazole Forte PO 1cp×2/j</p> <p>Ou</p> <p>- Ofloxacine 200 mg ×2/j</p> <p>Seule la présence d'un abcès objectivé sur un examen d'imagerie justifie une antibiothérapie prolongée au delà de 14 j</p>	14 jours au total
Sepsis urinaire chez patient connu porteur de E BLSE (résistance à la Rocéphine®)	Pyélonéphrite aiguë ou prostatite avec état septique aigu	<p><u>Avant résultats ECBU</u></p> <p>Ceftriaxone 2g/j IM * et 1 seule injection d'amikacine 20 mg/kg</p>	
Changement de sonde urinaire	ECBU systématiquement positif après plusieurs semaines de sondage	Pas de traitement antibiotique entourant de changement de sonde	

* En accord avec les recommandations 2011 du CASFM

INFECTIONS DIGESTIVES

Contexte		Traitement	Durée
Diarrhée	<p>Diarrhée simple, diarrhée sans fièvre</p> <p>diarrhée d'allure virale</p> <p>Si exposition récente aux antibiotiques Toxine de <i>Clostridium difficile</i> à rechercher sur coproculture</p>	<p>Rechercher une cause non infectieuse</p> <p>Pas d'antibiotique</p> <p>Si toxine de <i>Clostridium. difficile</i> positive - Métronidazole : 500 mg x 3 PO - Mesures d'isolement et de bio-nettoyage spécifiques.</p>	7 jours
Cholécystite Angiocholite	Douleur hypocondre droit, hyperthermie, signe de Murphy, ictère, sd inflammatoire	Transfert SAU	
Sigmoïdite Appendicite Péritonite	Douleur abdominale, hyperthermie, sd inflammatoire	Transfert SAU	

INFECTIONS DE LA PEAU ET DES TISSUS MOUS

Contexte		Traitement	Durée
Infection cutanée bactérienne primitive (érysipèle)	Placard cutané rouge douloureux avec fièvre	Amoxicilline 50mg/kg/j en 3 prises PO Allergie de type 1 Pristinamycine 1g×3/j PO	7 à 10 jours au total
Infection cutanée suppurative sévère ou récidivante	Furoncle volumineux (>5 cm) ou menaçant une zone noble, plaie chronique surinfectée Ne pas réaliser de prélèvement à l'écouvillon. Prélèvement d'escarre non indiqué	Cefaclor LP 500 mg×3/j PO Allergie de type 1 ou patient connu porteur de SARM Pristinamycine 1g×3/j PO	5 jours au total

Pied diabétique Grade 1	Atteinte cutanée isolée	Pas d'antibiothérapie	
Grade 2	Atteinte uniquement cutanée avec au moins 2 des signes suivants : chaleur, érythème péri ulcère entre 0,5 et 2cm, douleur, tuméfaction, écoulement purulent	Pas d'antibiothérapie en urgence, début après avis spécialisé	
Grade 3 superficiel	Erythème > 2cm + un des signes de grade 2) et Infection récente (< 1 mois)	Pas d'antibiothérapie en urgence, début après avis spécialisé	
Grade 3 profond et érysipèle ou grade 4	Infection atteignant les structures sous-cutanées : abcès, lymphangite, ostéoarthrite, ... Ou sepsis grave	Traitement probabiliste à débiter en urgence puis transfert SAU Amoxicilline-acide clavulanique 50mg/kg/j en 3 prise PO Allergie de type 1 ou patient connue porteur de SARM : Pristinamycine 1g×3/j PO	

INFECTION OCULAIRE

	Contexte	Traitement	Durée
Conjonctivite virale Très contagieuse, mettre en place des mesures pour limiter la diffusion aux autres patients	Conjonctivite bilatérale avec sd grippal. Contexte épidémique. Prélèvement à l'écouvillon si contexte épidémique	Pas d'antibiothérapie Rinçage au sérum physiologique et collyre antiseptique 3 fois par jour	
Conjonctivite bactérienne Contagieuse, mettre en place des mesures pour limiter la diffusion aux autres patients	Conjonctivite purulente, (pas de baisse d'acuité visuelle pas de douleur évoquant une kératite) Prélèvement à l'écouvillon.	Antibiothérapie après échec de soins locaux à 48H Tobramycine collyre 1gtte×3/j après lavage au sérum physiologique. Adaptation sur antibiogramme	7 jours au total

ANTIBIOTHERAPIE EN CAS DE FIEVRE ISOLEE

En l'absence de foyer ou de porte d'entrée retrouvée à l'examen clinique et de documentation bactériologique, la règle est de **ne pas débuter d'antibiothérapie à l'aveugle**, en dehors des circonstances suivantes :

- **retentissement systémique de l'infection.** Il s'agit d'un « syndrome septique » associant au syndrome infectieux (fièvre ou hypothermie, avec ou sans frissons) et des signes de mauvaise tolérance (hypotension ou choc, polypnée et/ou hypoxie, oligurie ou insuffisance rénale, thrombopénie ou CIVD, acidose métabolique, encéphalopathie)
- **terrain :** sujet neutropénique, immunodéprimé.

En cas de sepsis grave ou de choc septique, l'antibiothérapie sera initiée en urgence (délai < 1 heure) et en concertation avec le régulateur du SAMU.

Ceftriaxone 2g IM/IV + gentamicine 8 mg/kg en 1 IM/IV après prélèvement d'une hémoculture +/- ECBU (sans retarder l'administration des antibiotique) en attendant le transfert.

TABLEAU RECAPITULATIF DES PRINCIPALES MOLECULES ANTIBIOTIQUES DE PREMIERE INTENTION

Les posologies indiquées dans le tableau sont celles utilisées dans le traitement des infections courantes. Sauf exception, la posologie doit être adaptée à la fonction rénale (cf. Vidal).


Même en cas d'insuffisance rénale, la posologie de la première dose d'aminoside doit être celle administrée à un sujet à fonction rénale normale.

Famille	Antibiotique	Voie d'admin	Posologie standard pour 60 kg	Posologie standard pour 60 kg selon DFG
Penicillines	Amoxicilline (Clamoxyl®)	IV/IM	3 g /j en 3 injections	>30 ml/min : 1g×3/j
		PO	3 g/j en 3 prises	[10-30 ml/min]: 1g×2/j
	Amoxicilline /Acide clavulanique (Augmentin®)	PO	3 g/j en 3 prises	>30 ml/min : 1g×3/j
		IV	3 g/j en 3 injections	[10-30 ml/min]: 1g×2/j
C1G	Cefaclor (Alfatil®)	PO	1,5 g/j en 3 prises	[20-40 ml/min]: 500mg×2/j <20 ml/min: 500mg×1/j
C3G	Ceftriaxone (Rocephine®)	IV/IM	1g/j	<5 ml/min: 1g/48 h
Aminosides*	Gentamicine (Gentalline®)	IV/IM	6-8 mg/kg/j en une injection	Pas d'adaptation pour une dose unique
Macrolides	Spiramycine (Rovamycine®)	PO	9 MUI/j en 3 prises	Pas d'adaptation
Streptogramines	Pristinamycine (Pyostacine®)	PO	3 g/j en 3 prises	Pas d'adaptation

* Si insuffisance rénale : un flash d'aminoside est possible sans risque pour la fonction rénale

Famille	Antibiotique	Voie d'admin	Posologie standard pour 60 kg	Posologie standard pour 60 kg selon DFG
Sulfamides	Sulfaméthoxazole/ triméthoprime 800/160 (Bactrim Forte®)	PO	2 cp/j en 2 prises	>30 ml/min: 1cp×2/j [15-30 ml/min]: 1cp/j
Fluoro quinolones	Ofloxacine (Oflocet®)	PO	400 mg/j en 2 prises	>50 ml/min: 1cp×2/j [20-50 ml/min]: 1cp/j <20 ml/min: 1 cp/48 h
Nitro- imidazolés	Metronidazole (Flagyl®)	PO	1,5 g/j en 3 prises	>30 ml/min: 1cp×3/j <30 ml/min: 1cp×2/j
Autres	Furadantine	PO	6 gel/j en 3 prises	<50 ml/min : contre indication
	Fosfomycine (Monuril®)	PO	3g en une seule prise	Pas de modification

L'ensemble de ces recommandations a été rédigé en juin 2012. Elles sont en accord avec les dernières recommandations de l'AFSSAPS et celles des différentes Sociétés Savantes.



Agence Régionale de Santé d'Île-de-France
35 rue de la gare,
75935 PARIS CEDEX 19
Tél 01.44.02.00.00

<http://www.ars.iledefrance.sante.fr>
<http://www.sante-iledefrance.fr/>

