Stratégie et prise en charge de l'infection de prothèses

Atelier paramédicaux- GERICCO 2012

J-L POLARD - C. Arvieux

Centre de référence en infections ostéo-articulaires complexes

CHU de Rennes

PROBLEMATIQUE

- **Complication la plus dramatique**
- **Problème fonctionnel et infectieux**
- **Problème vital**
- **Problème diagnostique**
- **Problème législatif de responsabilité**
- **Problème de santé publique : coût**

EPIDEMIOLOGIE

● BAISSSE SIGNIFICATIVE DE LA PREVALENCE

PTH : 0,5 à 3% en première intention

4 à 6% pour les reprises aseptiques

PTG : 1 à 3 % semi contrainte

5 à 6 % en reprise

15 % prothèses charnières (volume)

● AUGMENTATION ++ DES POSES D'IMPLANTS

● NOMBRE ABSOLU CONSTANT : 850 / an en France
4000 / an aux USA

INFECTION ET ARTHROPLASTIE CLASSIFICATION

- **INFECTION AIGUE**
 - Précoc post-opératoire
 - Tardive hématogène

3 semaines

à 3 mois

- **INFECTION CHRONIQUE**

INFECTION ET ARTHROPLASTIE CLASSIFICATION

- INFECTION SUPERFICIELLE

Fascia lata

- INFECTION PROFONDE

DIAGNOSTIC POSITIF CLINIQUE

● AIGUE PRECOCE ou HEMATOGENE :

Clinique bruyante : Fièvre

Douleurs

Signes locaux

Tableau d'arthrite septique ds contexte de bactériémie ou septicémie.

Rechercher la porte d'entrée

DIAGNOSTIC POSITIF CLINIQUE

● RETARDEE CHRONIQUE :

Clinique parfois évidente: Fistule, état local inflammatoire.

Souvent bâtarde : douleurs, dégradation fonctionnelle...

ATCD de la prothèse : chir de reprise (trauma, ostéotomie, prothèses itératives...),

F.R. : PR++, corticoth. , diabète , malnutrition , obésité
Drépanocytose, âge ?

- **NFS** : Sensibilité faible (+ ds 15 à 32 % des cas)
- **VS** : Idem : en aigu dynamique trop lente
en chronique souvent négative
- **CRP ++** : Spécificité 92 % sensibilité 95 %
- **NB** : VS et CRP Normales = VPN élevée

DIAGNOSTIC POSITIF RADIOLOGIQUE

● **RX Standards :**

- Descellement bipolaire ++
- Appositions périostées
- Géodes endostées (scalloping) 76 à 91 % sont septiques
- Ostéolyses, Résorption irrégulière du Merckel
- Lisérés > 2 mm précoces, évolutifs

● **AUTRES** : Echographie, Arthroscanner, IRM

GAUCHE

GAUCHE

G

COUCHE

COUCHE

AP 1.58

07/03/2009 10:31:04

SURVEILLEZ LES IMPLANTS !

BUTS DU TRAITEMENT

- GUERIR L' INFECTION
- CONSERVER UNE FONCTION
- LIMITER LES RISQUES VITAUX
- A UN COUT ACCEPTABLE

UNE PROTHESE
UN PATIENT

SYNERGIE MEDICO-CHIR
D'UNE EQUIPE ENTRAINEE

- **MOINS DE UN MOIS :** **Aiguë précoce / Hématogène**
LAVAGE CHIRURGICAL
 + Bi-ATBth péri-opératoire adaptée aux germes pendant 3 mois. (Nouvelles quinolones ++)
- **BUT :** Essayer de conserver prothèse et fonction
 D'autant plus efficace que précoce ++
15 jours >1mois... au-delà ?? 3mois fini !!!
 Intérêt ++ si implants non cimentés avant osteointegration

INFECTION CHRONIQUE POSSIBILITES THERAPEUTIQUES

- **REIMPLANTATION PROTHETIQUE + ATB th**
 - DEUX TEMPS
 - UN TEMPS +++
- **SOLUTIONS PALLIATIVES**
 - Antibiothérapie exclusive au long cours
 - Fistulisation écho-guidée par drain
 - Résection tête-col
 - Arthrodèse du genou
 - Amputation

ANTIBIOTHERAPIE GENERALE

- Unanimement admise
- Ne peut être qu'un complément à la chirurgie
- Adaptée aux différentes bactéries
 - Discussion avec infectiologue et bactériologiste
 - Trouver le compromis entre efficacité microbiologique, bonne pénétration osseuse et bonne tolérance
 - Pas d'indication systématique à la voie IV si des molécules de bonnes biodisponibilité sont utilisables
- Durée : 4 à 12 semaines le plus souvent, non consensuelle, études en cours.

- **BUTS :** Rapport optimal de concentration locale
/ Toxicité générale
- **VECTEURS : Ciment PMMA+++**
Effet Dose ++ : Conc locales de Genta 200 x / IV
Adjonction d'ATB spécifiques possible
- **Intérêt non démontré en thérapeutique (contrairement à la prévention)**

SPACER = ESPACEURS !!

ABLATION DE PROTHESE

● IMPORTANCE DE LA VOIE D'ABORD

- * Hanche
 - Trochantérotomie
 - Voie trans-fémorale +++
 - Fenêtres ?
- * Genou :
 - Relèvement de la TTA
 - Plastie en V.Y de Insall

● IMPORTANCE DU MATÉRIEL

- * Flexilum°, Oscar°, Ortholav° ...

FEMOROTOMIE

PREMIER TEMPS

- **CINQ prélèvements bactériolo et anatomo (O₂, anO₂, Myco) des tissus et matériel (slime)**
- **Lavage pulsé ++**
- **RX per-op vérifiant l'absence de CE résiduels**
- **Changement complet d'instruments et de champs**
- **Deux options : Espaceur / Un temps RPTH**

REIMPLANTATION PROTHETIQUE EN DEUX TEMPS : INDICATIONS

● PTH infectée > 3 mois

- à germe inconnu
- à germe multi résistant
- à flore pluri microbienne
- ayant déjà fait l'objet d'une reprise en «1 temps»
- avec perte de substance nécessitant une greffe

● TERRAIN

compatible avec deux lourdes interventions à 3 mois d'intervalle

● SINON : UN TEMPS

ESPACEUR DE HANCHE

Cahier des charges

- **Véritable prothèse cervicocéphalique provisoire**
- **Propriétés mécaniques et biologiques de relargage des ATB**
- **Comblement de l'espace vide (limite les hématomes)**
- **Solidité et stabilité suffisantes / position assise, retour à domicile**
- **Préparer le lit de la prothèse définitive :**
 - **permet la planification pré-op (commande d'allogreffe, implants particuliers)**
 - **facilite la reprise / sciatique**
 - **extractibilité facile par une voie d'abord plus limitée si consolidation volet**
- **Coût acceptable**

STANDARD

CONFECTION D'UN SPACER SUR MESURE

FABRICATION DE LA TIGE

Deux doses de ciment

Façonner de proximal en distal

Remplir la fente du clou

**Bien renforcer la liaison
avec la tête**

FABRICATION DE LA TIGE

Façonner une collerette
stabilisatrice

Desépaissir :
Aux ciseaux ++
Sinon à la rape !!

REIMPLANTATION

- Trois mois plus tard : Etat clinique
- Bilan Biologique NFS VS CRP
- Scinti PNN* : Plus systematique
- Ponction : Non systématique
- Voies d'abord: postérieure ou reprise de fémorotomie plus que trochanterotomie
- Cotyle: press fit +/- dble mobilité
 greffons + croix+cimenté
- Tige : sans ciment HA verrouillée
 cimentée type CMK si troch

SECABLE !!

Post-op

Mme DUM. PTH 2002
Infection staph épi métiR
chronique
Extension per op aux
parties molles++
Spacer 01 2005

4mois

4 ans PMA 6.6.6

LES ESPACEURS AU GENOU

Mme Roch.

70ans

Arthrodèse temporaire par espaceur pdt 2 mois

Arthrodèse définitive par implant sur mesure

Alternative à l'amputation

EVOLUTION DES ESPACEURS

LES ESPACEURS AU GENOU

Mme Guil. 70 ans

**PTG postéro
stabilisée scellée en
2001. Infection
chronique post-op
probable. Fistule.**

Staph épi méti-S

LES ESPACEURS AU GENOU

LES ESPACEURS AU GENOU

LES ESPACEURS AU GENOU

CERASPACER

PARFOIS LAMBEAUX NECESSAIRES

CONCLUSION = PREVENTION

- « Le seul traitement absolu est préventif... » +++
- Recherche de foyers infectieux : dents, ORL, urines, peau: Bilan pré prothèse ++
- Flux laminaire
- Scaphandre (tente de Charnley)
- Antibioprophylaxie per-op
- Ciment aux ATB
- Geste chirurgical atraumatique

CONCLUSION

- **Affection pourtant inéluctable**
- **Grave et lourde de conséquences**
- **Prise en charge multidisciplinaire**
 - **Importance de discussions RCP, de visites et consultations pluridisciplinaires**
- **Sélection argumentée des patients**
- **Décision thérapeutique la plus adaptée**
- **Protocoles à venir**