

Qui ne vient pas chercher ses résultats après un dépistage positif d'une IST en CeGIDD ?

CeGIDD des HU Saint-Louis – Lariboisière – Fernand Widal (AP-HP)

Camille Rolland, Christophe Segouin, Élise de La Rochebrochard, Marc Shelly, Pénélope Troude

- **Des infections sexuellement transmissibles en recrudescence**
 - **Le non-retour en consultation de rendu des résultats en CeGIDD**
 - **Programme de notification par sms après un dépistage**
- rechercher les facteurs associés au non-retour dans les 30 jours des consultants dépistés positifs**

Parmi les 266 patients dépistés positifs au cours de la période d'étude, **214 consultants** ont renseigné un questionnaire et ont donc été inclus dans l'étude (taux de participation 80%)

- Description de la population d'étude (n=214):
 - âge médian **27 ans**
 - grande majorité d'**hommes** (72%)
 - résidant majoritairement à **Paris** (62%)
 - nés pour moitié en **France métropolitaine** (56%), pour un quart en **Afrique subsaharienne** (24%)
 - 30% d'hommes ayant exclusivement des rapports sexuels avec des hommes (**HSH exclusifs**)
 - au moins **5 IST dépistées** parmi les 6 possibles pour un peu plus de la moitié des consultants (53%)

- Variables au FTR30:
 - **Jeune** de moins de 25 ans
 - Non réponse à la question de **la réalisation d'un test de dépistage dans les douze derniers mois**
 - **Risque perçu vis-à-vis du VIH faible ou absent**
 - **Réalisation d'un dépistage chlamydia/gonocoque** par auto prélèvement (vaginal, urinaire, anal ou de l'oropharynx)
 - **Accompagnement** à la primo consultation

→Rôle des facteurs comportementaux vis-à-vis de la prévention (notion de littéracie en santé)

- **Notification par SMS**

Plus de 70% de la population participe au programme de notification par SMS

Taux de non-retour était **plus faible** chez les consultants **ayant accepté** d'être notifiés par **SMS** que ceux ayant refusé, sans différence **statistiquement significative** (12% vs 20%, $p=0,10$)

MERCI